

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בשכרית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	המחלות להתרמה
אבדורט	AVODART	DUTASTERIDE	טיפול בהגדלת הפרוסטטה שפירה	מותר להתרים 6 חודשים לאחר סיום הטיפול
אביאנה	EVIANA	ESTRADIOL, NORETHISTERONE	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
אביטרן	ABITREN	DICLOFENAC	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אביטרן	ABITREN	DICLOFENAC	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
אביטרקסט	ABITREXATE		טיפול במחלות ממאירות ואוטואימוניות	אסור להתרים
אביליפי	ABILIFY	ARIPRAZOLE	טיפול בסכיזופרניה ובעיות נפשיות שונות	יש לפנות לסמכות רפואית
אבנדיה	AVANDIA	ROSIGLITASONE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
אבנדמט	AVANDAMET	METFORMIN, ROSIGLITASONE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
אברול	ABROL	PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים
אברול	ABROL	PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
אגיסרק	AGISERC	BETAHISTINE	טיפול במחלת מנייר	מותר להתרים אם אין סחרחורת ביום התרומה
אגרלין	AGRYLIN	ANAGRELIDE	לדילול דם	אסור להתרים
אגרנוקס	AGGRENOX	ACETYL SALICYLIC ACID, DIPYRIDAMOLE	לדילול דם לאחר CVA / TIA	אסור להתרים
אדויל	ADVIL	IBUPROFEN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אדויל	ADVIL	IBUPROFEN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
אדויל	ADVIL	IBUPROFEN	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אדיזם	ADIZEM	DILTIAZEM	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אדיזם	ADIZEM	DILTIAZEM	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
אדין	ADIN	DESMOPRESSIN	טיפול בסכרת תפלה	אסור להתרים
אדקס	ADEX	IBUPROFEN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אדקס	ADEX	IBUPROFEN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
אדקס	ADEX	IBUPROFEN	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אדרונקס	EDRONAX	REBOXETINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אהיסטון	AHISTON	CHLORPHENIRAMINE	טיפול נגד אלרגיה	מותר להתרים
אובג'יו	AUBAGIO	TERIFLUNOMIDE	טיפול בטרשת נפוצה	אסור להתרים.
אוגמנטין	AUGMENTIN	AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אוויסטה	EVISTA	RALOXIFENE	טיפול באוסטיאופורוזיס	מותר להתרים
אוומין	UVAMIN	NITROFURANTOIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אווסטין	AVASTIN	BEVACIZUMAB	טיפול במחלות ממאירות	אסור להתרים
אוסזלה	OTEZLA	APREMILAST	טיפול בפסוריאזיס קשה/ דלקת פרקים פסוריאטית פעילה	אסור להתרים.
אוטרקס	OTAREX	HYDROXYZINE	טיפול במצבי לחץ וחרדה	מותר להתרים
אולבטם	OLBETAM	ACIPIMOX	להורדת שומנים בדם	מותר להתרים
אולנזפין	OLANZAPINE	OLANZAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אולסניק	ULSANIC	SUCRALFATE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
אומניק	OMNIC	TAMSULOSIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
אומפרדקס	OMEPRADDEX	OMEPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה, רפלוקס, הליקובקטר	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
אומפרה	OMEPRAX	OMEPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה, רפלוקס, הליקובקטר	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
אומפרזול	OMEPRAZOLE	OMEPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
אומפריקס	OMEPRIX	OMEPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
אומקור	OMACOR	OMEGA 3	להורדת שומנים בדם	מותר להתרים
אונגלייזה	ONGLYZA	SAXAGLIPTIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	הנחיות לתורמה
אוסמו אדלט	OSMO ADALAT	NIFEDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אוסמו אדלט	OSMO ADALAT	NIFEDIPINE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
אוספולוט	OSPOLOT	SULTHIAME	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
אופטליגין	OPTALGIN	DIPYRONE	נגד כאבים	מותר להתרים
אופטליגין	OPTALGIN	DIPYRONE	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
אופלודקס	OFLODEX	OFOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אופלודקס	OFOXACIN	OFOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אופסומיט	OPSUMIT	MACITENTAN	טיפול ביתר לחץ דם בעורק ריאתי	אסור להתרים
אוקסאאר	OCSAAR	LOSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אוקסאאר	OCSAAR	LOSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
אוקסופורין	OXOPURIN	PENTOXIFYLLINE	טיפול במחלות כלי הדם	מותר להתרים בהתאם למצב הרפואי
אוקסיבאנין	OXYBUTYNIN	OXYBUTYNIN	טיפול בדחיסות במתן שנת	מותר להתרים אם אין עדות/חשד לדלקת
אוקסיס טורבוהלר	OXIS TURBUHALER	FORMOTEROL	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
אוקסיס טורבוהלר	OXIS TURBUHALER	FORMOTEROL	טיפול ב-COPD	מותר להתרים אם אין קוצר נשימה במאמץ קל ו/או מחלה חריפה
אוקסיקוד	OXYCOD	OXYCODONE	טיפול בכאבים	יש לפנות לסמכות רפואית
אוקסיקונטין	OXYCONTIN	OXYCODONE	טיפול בכאבים	לפנות לסמכות רפואית
אוקרבון	EUCARBON	CHARCOAL, SENNA	טיפול בעצירות וגזים	מותר להתרים
אוראפ פורטה	ORAP FORTE	PIMOZIDE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אורבניל	ORBENIL	CLOXACILLIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אורגנין	URGENIN	Natural Extracts	טיפול בשלפוחית שתן רגיזה	מותר להתרים אם אין עדות/חשד לדלקת
אורורק	UROREC	SILODOSIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
אוריקל	URIKAL	Natural Extracts	טיפול בדלקת בדרכי השתן	מותר להתרים לאחר החלמה.
אורלטן	ORALTEN	CLOTRIMAZOLE	טיפול בפטרת בפה	אסור להתרים
אורליט-U	URALIT-U	POTASSIUM SODIUM	טיפול באבני כליה	מותר להתרים אם תפקודי כליות תקינים ואין דלקת
אורמוקס	URAMOX	ACETAZOLAMIDE	טיפול באי ספיקת לב	אסור להתרים
אורמוקס	URAMOX	ACETAZOLAMIDE	טיפול בלחץ תוך גולגולתי גבוה	אסור להתרים
אורמוקס	URAMOX	ACETAZOLAMIDE	טיפול בגלאוקומה	מותר להתרים
אורנסיה	ORENCIA	ABATACEPT	טיפול בראומטיזם ארטריטיס פעילה	אסור להתרים
אורסוליט	URSOLIT	URSODEOXYCHOLIC ACID	טיפול במחלות כבד	אסור להתרים
אורסוליט	URSOLIT	URSODEOXYCHOLIC ACID	טיפול באבני מרה	מותר להתרים אם תורם אסימפטומטי ואין דלקת
אורסופאלק	URSOFALK	URSODEOXYCHOLIC ACID	טיפול במחלות כבד	אסור להתרים
אורסופאלק	URSOFALK	URSODEOXYCHOLIC ACID	טיפול באבני מרה	מותר להתרים אם תורם אסימפטומטי ואין דלקת
אורסינון	ORSINON	TOLBUTAMIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
אזופי	AZOPI	AZATHIOPRINE	מדכא מערכת החיסונית	אסור להתרים
אזטרול	EZETROL	EZETIMIBE	טיפול בכולסטרול גבוה	מותר להתרים
אזיטרומיצין	AZITHROMYCIN	AZITHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אזילקט	AZILECT	RASAGILINE	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצב התורם
אזניל	AZENIL	AZITHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אחד אלפא	ONE-ALPHA	ALFACALCIDOL	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
אטאקנד	ATACAND	CANDESARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אטודולק	ETODOLAC	ETODOLAC	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אטודולק	ETODOLAC	ETODOLAC	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
אטופן	ETODOLAC	ETODOLAC	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אטופן	ETODOLAC	ETODOLAC	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
אטורבה	ATORVA	ATORVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
אטורבסטאטין	ATORVASTATIN	ATORVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
אטנט	ATTENT	AMPHETAMINE	טיפול בהפרעות קשב ופעלתנות יתר (ADHD)	מותר להתרים
	ATTENT	AMPHETAMINE	טיפול בנרקולפסיה	אסור להתרים
אטרובנט	ATROVENT	IPRATROPIUM	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות לאסטמה
איבופן	IBUFEN	IBUPROFEN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
איבופן	IBUFEN	IBUPROFEN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
איבופרופן	IBUPROFEN	IBUPROFEN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	החרייה	ההחיות להחרייה
איבופרופן	IBUPROFEN	IBUPROFEN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
איבופרופן	IBUPROFEN	IBUPROFEN	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
איזולונג	ISOLONG	ISOSORBIDE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
איזוניאזיד	ISONIAZID	ISONIAZID	טיפול מניעתי נגד שחפת	מותר להתרים 6 חודשים לאחר סיום הטיפול
איזוניאזיד	ISONIAZID	ISONIAZID	טיפול בשחפת	מותר להתרים שנתיים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
איזוקט ספריי	ISOKET SPRAY	ISOSORBIDE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
איטרנול	ITRANOL	ITRACONAZOLE	טיפול בפטרת בעור וציפורניים	מותר להתרים
אימובן	IMOVAN	ZOPICLONE	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
אימיום	IMODIUM	LOPERAMIDE	נגד שלשולים	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
אימיטרקס	IMITREX	SUMATRIPTAN	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרים 24 שעות לאחר ההתקף
אינג'י	INEGY	EZETIMIBE, SIMVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
אינדוביס	INDOVIS	INDOMETHACIN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אינדוביס	INDOVIS	INDOMETHACIN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
אינדומד	INDOMED	INDOMETHACIN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אינדומד	INDOMED	INDOMETHACIN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
אינובלון	INOVELON	RUFINAMIDE	נגד התקוצויות	אסור להתרים
אינונגה	INVEGA	PALIPERIDONE	טיפול בסכיזופרניה	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אינוקנה	INVOKANA	CANAGLIFOZIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
אינספרה	INSPIRA	EPLERENONE	טיפול באי ספיקת לב	אסור להתרים
איקאפרס	IKAPRESS	VERAPAMIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
איקאפרס	IKAPRESS	VERAPAMIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
איקאקור	IKACOR	VERAPAMIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
איקאקור	IKACOR	VERAPAMIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
איקאקלומין	IKACLOMIN	CLOMIPHENE	טיפול בהפרעות פוריות	מותר להתרים
איקסל	IXEL	MILNACIPRAN	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
אירובנט	AEROVENT	IPRATROPIUM	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות לאסטמה
אלדומין	ALDOMIN	METHYLDOPA	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אלדוספירון	ALDOSPIRONE	SPIRONOLACTONE	טיפול במחלות לב, כבד, כליות	אסור להתרים
אלדוספירון	ALDOSPIRONE	SPIRONOLACTONE	טיפול ביתר לחץ דם, בעיות הורמונליות	מותר להתרים
אלדקטון	ALDACTONE	SPIRONOLACTONE	טיפול במחלות לב, כבד, כליות	אסור להתרים
אלדקטון	ALDACTONE	SPIRONOLACTONE	טיפול ביתר לחץ דם, בעיות הורמונליות	מותר להתרים
אלוריל	ALLORIL	ALLOPURINOL	טיפול בגאوت	מותר להתרים
אלטרול	ELATROL	AMITRIPTYLINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אלטרולט	ELATROLET	AMITRIPTYLINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אלטרקסין	ELTROXIN	THYROXINE SODIUM	טיפול בתת פעילות של בלוטת התריס	מותר להתרים אם תפקודי בלוטת התריס תקינים
אליקוויס	ELIQUIS	APIXABAN	לדילול דם	לפנות לסמכות רפואית. לא לטרומבוציטים
אלנדרובניר	ALENDROVENIR	ALENDRONIC ACID	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
אלנדרונט	ALENDRONATE	ALENDRONATE	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
אלפא די 3	ALPHA D3	ALFACALCIDOL	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
אלפוקל-XL	ALFU KAL XL	ALFUZOSINE	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
אלפוזסין	ALFUZOSIN	ALFUZOSINE	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
אלפרוקס	ALPROX	ALPRAZOLAM	טיפול במצבי חרדה ודיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אלפרלד	ALPRALID	ALPRAZOLAM	טיפול במצבי חרדה ודיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אלקה זלצר	ALKA SELTZER	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אלקה זלצר	ALKA SELTZER	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אלקה זלצר	ALKA SELTZER	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אלרג'י	ALLERGY	LORATADINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
אלרג'י-קאר	ALLERGY-CARE	CETIRIZINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
אמביאן	AMBIEN	ZOLPIDEM	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
אמביב	AMEVIVE	ALEFACEPT	טיפול אימונוסופרסיבי לפסוריאזיס קשה	אסור להתרים

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	הנחיות לתורמה
אמוקסי	AMOXI	AMOXICILLIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אמוקסיקלב	AMOXICLAV	AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
אמיודקור	AMIODACORE	AMIODARONE	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים
אמיוקור	AMIOCOR	AMIODARONE	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים
אמלו	AMLOW	AMLODIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אמלו	AMLOW	AMLODIPINE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
אמלודיפין	AMLODIPINE	AMLODIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אמלודיפין	AMLODIPINE	AMLODIPINE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
אמריל	AMARYL	GLIMEPIRIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
אנאפרניל	ANAFRANIL	CLOMIPRAMINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אנברל	ENBREL	ETANERCEPT	טיפול אימונוסופריטיבי	אסור להתרים
אנג'ליק	ANGELIQ	Drorsiprenone & Estradiol	טיפול הורמונלי בגיל המעבר (HRT)	מותר להתרים
אנגריד	ANAGRID	ANAGRELIDE	טיפול בטרומבוציטמיה אסנציאלית	אסור להתרים
אנגרליד אורפה	ANAGRELIDE ORPHA	ANAGRELIDE	טיפול בטרומבוציטמיה אסנציאלית	אסור להתרים
אנדרוקור	ANDROCUR	CYPROTERONE	נשים	מותר להתרים
אנדרוקור	ANDROCUR	CYPROTERONE	גברים	אסור להתרים אם מטופל בקרצינומה של הפרוסטטה, מותר להתרים אם להפרעה בתיפקוד מיני
אנדרוקסון	ANDROXON	TESTOSTERONE	טיפול לחסר סטוסטרון	מותר להתרים
אנטומין	ENTUMINE	CLOTHIAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אנטוקורט	ENTOCORT	BUDESONIDE	טיפול בקוליטיס ומחלת קרוהן	אסור להתרים
אנטיביו	ENTYVIO	VEDOLIZUMAB	טיפול בקוליטיס ומחלת קרוהן	אסור להתרים
אנלדקס	ENALADEX	ENALAPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אנלדקס	ENALADEX	ENALAPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
אנלפריל	ENALAPRIL	ENALAPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אנלפריל	ENALAPRIL	ENALAPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
אנציפלמד	ENCYPALMED	PANCREATIN, OX BILE OIL	טיפול באי נוחות במע' העיכול/גדים	מותר להתרים אם אין עדות לדלקת חריפה
אס.בי.טי.2	SBT 2	BUPRENORPHINE	טיפול חלופי לתלות באופיאטים	יש לפנות לסמכות רפואית
אסאקול	ASACOL	MESALAZINE	טיפול במחלת קרוהן ואולצרטב קוליטיס	אסור להתרים
אסברייט	ESBRIET	PIRFENIDONE	טיפול במחלה ריאתית פיברוטית	אסור להתרים
אסטו	ESTO	ESCITALOPRAM	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
אסטל	ESTELLE	CYPROTERONE, ETHINYLESTRADIOL	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
אסטקופם	ESTROFEM	ESTRADIOL	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
אסיול	ASSIVAL	DIAZEPAM	טיפול במצבי חרדה	מותר להתרים
אספירון קרדיו	ASPIRIN CARDIO	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אספירין	ASPIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אספירין	ASPIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אספירין	ASPIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אספירין	ASPIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	טיפול במחלה ראומוטית	אסור להתרים
אספקס	ASPEX	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אספקס	ASPEX	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אסציטאלופרם	ESCITALOPRAM	ESCITALOPRAM	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אסקזול	ESKAZOLE	ALBENDAZOLE	טיפול באכינוקוקוס	אסור להתרים
אסריל	ACERIL	CAPTAPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אסריל	ACERIL	CAPTAPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
אפובנט	APOVENT	IPRATROPIUM	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות לאסטמה
אפיאנט	EFFIENT	PRASUGREL	לדילול דם	לפנות לסמכות רפואית. לא לטרומבוציטים
אפלרנון	EPLERENONE	EPLERENONE	טיפול באי ספיקת לב	אסור להתרים
אפנוטין	EPANUTIN	PHENYTOIN	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
אפנוטין	EPANUTIN	PHENYTOIN	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אפקסור	EFEXOR	VENLAFAXINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
אצטוסאל	ACETOSAL	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	החתימה	ההמלצות לתורמה
אצטוסאל	ACETOSAL	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אצטוסאל	ACETOSAL	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אציקל-וי	ACYCLO-V	ACYCLOVIR	טיפול בהרפס	מותר להתרים לאחר החלמה (ראה הנחיות)
אציקל-וי	ACYCLO-V	ACYCLOVIR	טיפול מניעתי נגד הרפס	מותר להתרים
אקוודון	AQUADON	CHLORTHALIDONE	טיפול בבעיות לב, מחלות כבד, אי ספיקת כליות	אסור להתרים
אקטונל	ACTONEL	RISEDRONIC ACID	טיפול באוסטאופורוזיס, מחלת פג'ט	מותר להתרים
אקטוס	ACTOS	PIOGLITAZONE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
אקטיבל	ACTIVELLE	Norethisterone& Estradiol	טיפול הורמונלי בגיל המעבר (HRT)	מותר להתרים
אקטיפרין	AKTIFERRIN F	FERROUS SULPHATE	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח תיקון אנמיה/ חסר ברזל והמגולובין תקין
אקטמרה	ACTEMRA	TOCILIZUMAB	טיפול אימונוסופרסיבי לדלקת פרקים פעילה	אסור להתרים
אקלסטה	ACLASTA	ZOLEDRONIC ACID	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
אקמול	ACAMOL	PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים
אקמול	ACAMOL	PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
אקמול פוקוס	ACAMOL FOCUS	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אקמול פוקוס	ACAMOL FOCUS	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אקמול פוקוס	ACAMOL FOCUS	PARACETAMOL, CAFFEINE,	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אקמול פוקוס	ACAMOL FOCUS	PARACETAMOL, CAFFEINE,	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אקסדרין	EXCEDRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אקסדרין	EXCEDRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אקסידול	EXIDOL	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אקסידול	EXIDOL	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
אקספורג'	EXFORGE	AMLODIPINE, VALSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
אקרוז	ACROSE	ACARBOSE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
ארדוטין	ERDOTIN	ERDOSTEINE	נגד שעול עם ליחה	מותר להתרים לאחר סיום הטיפול והחלמה
אריפלי	ARIPLY	ARIPRAZOLE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין וזא לתרום מרצון
ארט 50	ART 50	DIACEREIN	טיפול באוסטאוארטריטיס	מותר להתרים
ארטופן	ARTOFEN	IBUPROFEN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
ארטופן	ARTOFEN	IBUPROFEN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
ארטרותק	ARTHROTEC	DICLOFENAC	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
ארטרותק	ARTHROTEC	DICLOFENAC	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
ארטרותק	ARTHROTEC	MISOPROSTOL, DICLOFENAC	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
ארטריל	ARTHRYL	GLUCOSAMINE	טיפול באוסטאוארטריטיס	מותר להתרים
אריס	AERIUS	DESLOTRADINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
ארינאז	AERINAZE	DESLOTRADINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
אריתרן טבע	ERYTHRO TEVA	ERYTHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
ארקוקסיה	ARCOXIA	ETORICOXIB	טיפול נגד כאבים, בעיקר בעצמות ופרקים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
באפרד פירין	BUFFERED PIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
באפרד פירין	BUFFERED PIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
באפרד פירין	BUFFERED PIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
בדודקה	BEDODEKA	B 12	זריקות טיפול בחוסר B12	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה חוסר B12)
בדיקורט - משאף	BUDICORT	BUDESONIDE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
בוסון	BUDESON	BUDESONIDE	טיפול בקולטיס ומחלת קרוהן	אסור להתרים
בוטרנס	BUTRANS	BUPRENORPHINE	כאב, טיפול חלופי לתלות באופיאטים	יש לפנות לסמכות רפואית
בונדורמין	BONDORMIN	BROTIZOLAM	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
בונסרין	BONSERIN	MIANSERIN	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
בזפיברט	BEZAFIBRATE	BEZAFIBRATE	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
בטאהיסטין	BETAHISTINE	BETAHISTINE	טיפול במחלת מנייר	מותר להתרים אם אין סחרחורת ביום התרומה

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בשבירת	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	הנחיות להחרמה
בטאים	BETAZIM	Betaine HCL & Pepsin	טיפול באי נוחות במע' העיכול	מותר להתרים אם אין עדות לגסטראנטריטיס חריפה
בטיסטין	BETISTINE	BETHAHISTINE	טיפול במחלת מנייר	מותר להתרים אם אין סחרחורת ביום התרומה
בטמיגה	BETMIGA	MIRABEGRON	טיפול בדחיות במתן שתן	מותר להתרים
בטנזול	BETNESOL	BETAMETHASONE	טיפול במחלות אוטואימוניות, התקפי אסטמה/ אלרגיה	אסור להתרים במהלך הטיפול, לתרומות עתידיות לפנות לסמכות רפואית
בטרן	BETAREN	DICLOFENAC	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
בטרן	BETAREN	DICLOFENAC	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
ביודרוקסיל	BIODROXIL	CEFADROXIL	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
ביוסרופין	BIO-TROPIN	SOMATROPIN	קומה נמוכה, תסמונת טרנר, הפרעות כלתיות	אפשר להתרים אם ההתוויה מאפשרת תרומה
בייטה	BYETTA	EXENATIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים 24 שעות לאחר הזריקה
בידורין	BYDUREON	EXENATIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים 24 שעות לאחר הזריקה
ביטני X	BITNI X	BISMUTH SALICILATE	טיפול בשלשול חד פעמי, בחילה, אי נוחות במע' העיכול	מותר להתרים אם אין עדות לגסטראנטריטיס חריפה
ביסולול	BISOLOL	BISOPROLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק
ביסולול	BISOLOL	BISOPROLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
ביסופרולול	BISOPROLOL	BISOPROLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק
ביסופרולול	BISOPROLOL	BISOPROLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
ביקאלוטמיד	BICALUTAMIDE	BICALUTAMIDE	טיפול בסרטן פרוסטטה	אסור להתרים
ביקמיד	BICAMIDE	BICALUTAMIDE	טיפול בסרטן פרוסטטה	אסור להתרים
בנאזפריל	BENAZEPRIL	BENAZEPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
בנאזפריל	BENAZEPRIL	BENAZEPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
בקלוסל	BACLOSAL	BACLOFEN	טיפול בהתכווצויות שרירים	יש לפנות לסמכות רפואית
בקלופורטה - משאף	BECLOFORTE	BECLOMETHASONE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות לאסטמה
ברוטזולאם	BROTIZOLAM	BROTIZOLAM	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
ברילינטה	BRILINTA	TICAGRELOR	דילול דם	לפנות לסמכות רפואית. לא לטרומבוציטים
ברנטקס	BRINTELLIX	VORTIOXETINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצון
בריקלין	BRICALIN	TERBUTALINE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
ברקסין	BREXIN	PIROXICAM	טיפול בדלקת פרקים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
ג'ארדיאנס	JARDIANCE	EMPAGLIFLOZOLIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
ג'נואט	JANUET	METFORMIN, SITAGLIPTIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
ג'נוביה	JANUVIA	SITAGLIPTIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
גאבאפנטין	GABAPENTIN	GABAPENTIN	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
גאבאפנטין	GABAPENTIN	GABAPENTIN	טיפול בכאב נירופטי	לפנות לבירור לסמכות רפואית
גאדון	GEODON	ZIPRASIDONE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצון
גאלבוס	GALVUS	VIDAGLIPTIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
גאסטרו	GASTRO	FAMOTIDINE	טיפול בכיב קיבה או תריסרון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
גביסקון	GAVISCON	ALGINIC ACUD	טיפול ברפלוקס קיבה-ושט וצרכת	מותר להתרים
גודמד	GODAMED	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
גוטרון	GUTRON	MIDODRINE	טיפול ב"ד" אורטוסטטי	אסור להתרים
גילניה	GILENYA	FINGOLIMOD	טיפול בסרשת נפוצה	אסור להתרים
גילקס	GILEX	DOXEPINE	טיפול בדיכאון ומצבי חרדה	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצון
גיפלין	GLYPHYLLIN	THEOPHYLLINE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
גלובן	GLUBEN	GLIBENCLAMIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
גלופור	GLUFOR	METFORMIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
גלוקו-רייט	GLUCO-RITE	GLIPIZIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
גלוקומין	GLUCOMIN	METFORMIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
גלוקופג'	GLUCOPHAGE	METFORMIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
גלי'בנקלמיד	GLIBENCLAMIDE	GLIBENCLAMIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
גלימפיריד	GLIMEPIRIDE	GLIMEPIRIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
ג'קסטייד	JUXTAPID	LOMITAPIDE	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
ג'קאבי	JAKAVI	RUXOLITINIB	טיפול במחלות המטולוגיות	אסור להתרים
גריפולין פורטה	GRIFULIN FORTE	GRISEOFULVIN	טיפול בפטרת בעור וציפורניים	מותר להתרים

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בשכרית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	החתימה	ההנחיות להתייחסות
גרמזה פירין	GRAMSE PIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
גרמזה פירין	GRAMSE PIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
דאלאצין	DALACIN	CLINDAMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
דואודופה	DUODOPA	CARBIDOPA, LEVODOPA	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
דואודרט	DUODART	DUTASTERIDE, TAMUSULOSIN	טיפול בהגדלת הפרוסטטה שפירה	מותר להתרים 6 חודשים לאחר סיום הטיפול
דולוקסטין	DULOXETINE	DULOXETINE	טיפול בדיכאון במתן שתי	מותר להתרים
דוסטיניקס	DOSTINEX	CABERGOLINE	טיפול ברמת פרולקטין גבוהה	יש לפנות לסמכות רפואית
דופיקר	DOPICAR	CARBIDOPA, LEVODOPA	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
דופלקס	DUPLEX	AMLODIPINE, VALSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
דופסטון	DUPHASTON	DYDROGESTERONE	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
דוקסאלוק	DOXALOC	DOXAZOSIN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
דוקסאלוק	DOXALOC	DOXAZOSIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
דוקסי	DOXY	DOXYCYCLINE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
דוקסילין	DOXYLIN	DOXYCYCLINE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
דטרוסיל	DETRUSITOL	TOLTERODINE	טיפול בבריחת שתן	מותר להתרים
דיאביטקס	DIABITEX	CHLORPROPAMIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
דיאנה	DIANE	CYPROTERONE, ETHINYLESTRADIOL	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
דיאסרין	DIACEREIN	DIACEREIN	טיפול באוסטיאוארטריטיס	מותר להתרים
דיאטרים	DIATRIM	DIACEREIN	טיפול באוסטיאוארטריטיס	מותר להתרים
דיבנילין	DIBENYLIN	PHENOXYBENZAMINE	טיפול בפאורומוציטומה	אסור להתרים
דיבנילין	DIBENYLIN	PHENOXYBENZAMINE	טיפול בהגדלת הפרוסטטה שפירה	מותר להתרים
דיגוקסין	DIGOXIN	DIGOXIN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
דיובאן	DIOVAN	VALSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
דיובאן	DIOVAN	VALSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
דיוזיתאזיד	DISOTHIAZIDE	HYDROCHLOROTHIAZIDE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
דילאטם	DILATAM	DILTIAZEM	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
דילאטם	DILATAM	DILTIAZEM	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
דילטיאזם	DILTIAZEM	DILTIAZEM	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
דילנטין	DILANTIN	PHENYTOIN	נגד התקוות	אסור להתרים
דיספטיל	DISEPTYL	SULPHAMETHOXAZOLE TRIMETHOPRIM	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
דנול	DANOL	DANAZOL	טיפול באנדומטריוזיס, שחלות פוליציסטיות, אנגיודומה ועוד	מותר להתרים בהתאם למחלה/ מצב רפואי
דגלון	DANALONE	PREDNISOLONE	טיפול במחלות אוטואימוניות, בעיות אדוקרניות, ממאירות	אסור להתרים
דסלורטדין	DESLOTRADINE	DESLOTRADINE	נגד אלרגיה	מותר להתרים
דסמופרסין	DESMOPRESSIN	DESMOPRESSIN	טיפול בסכרת תפלה	אסור להתרים
דסמופרסין	DESMOPRESSIN	DESMOPRESSIN	טיפול בהרבת לילה	מותר להתרים
דפוניט NT מדבק	DEPONT NT PATCH	GLYCERIL TRINITRATE	מחלת לב איסכמית	אסור להתרים
דפלפט	DEPALEPT	SODIUM VALPROATE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
דפלפט	DEPALEPT	SODIUM VALPROATE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
דפרקסן	DEPREXAN	DESIPRAMINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
דקינט	DEKINET	BIPERIDEN	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
דקסימון	DEXIMUNE	CICLOSPORIN	מדכא מערכת החיסונית	אסור להתרים
דקסמול	DEXAMOL	PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים
דקסמול	DEXAMOL	PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
דקסמטזון	DEXAMETHASONE	DEXAMETHASONE	טיפול במחלות אוטואימוניות, התקפי אסטמה/ אלרגיה	אסור להתרים במהלך הטיפול, לתרומות עתידיות לפנות לסמכות רפואית
דרלין	DERALIN	PROPRANOLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק
דרלין	DERALIN	PROPRANOLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
דרלין	DERALIN	PROPRANOLOL	טיפול בתנועות בלתי רצוניות	מותר להתרים בהתאם למחלה/ מצב רפואי. יש לבדוק דופק

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	הנחיות להתרמה
דרלין	DERALIN	PROPRANOLOL	למניעת התקפי מיגרנה	יש לבדוק דופק
היטרין	HYTRIN	TERAZOSIN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
היטרין	HYTRIN	TERAZOSIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
היסטזין	HISTAZINE	CETIRIZINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
היסטפד	HISTAFED	PSEUDOEPHEDRINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
היפנדורם	HYPNODORM	FLUNITRAZEPAM	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
היפרקס	HIPREX	HEXAMINE	טיפול בדלקת בדרכי השתן	מותר להתרים לאחר סיום הטיפול והחלמה
הלדול	HALDOL	HALOPERIDOL	טיפול בתסמונת טורט	מותר להתרים
הלדול	HALDOL	HALOPERIDOL	טיפול בבעיות פסיכיאטריות	לפנות לבירור לסמכות רפואית
הלופר	HALOPER	HALOPERIDOL	טיפול בתסמונת טורט	מותר להתרים
הלופר	HALOPER	HALOPERIDOL	טיפול בבעיות פסיכיאטריות	לפנות לבירור לסמכות רפואית
הלסיון	HALCION	TRIAZOLAM	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
הקסקפרון	HEXAKAPRON	TRANEXAMIC ACID	טיפול בדמם	אסור להתרים
ואבן	VABEN	OXAZEPAM	טיפול בחרדה	מותר להתרים
וואדיפ	VASODIP	LERCANIDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
וולבטרין	WELLBUTRIN	BUPROPION	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
וולטרין	VOLTAREN	DICLOFENAC	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
וולטרין	VOLTAREN	DICLOFENAC	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרוםבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
ווליבריס	VOLIBRIS	AMBRISANTAN	טיפול ביתר לחץ דם בעורק ריאתי	אסור להתרים
וונלה	VENLA	VENLAFAXINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
וואדיפ	VASODIP	ENALAPRIL, LERCANIDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
ויאגרה	VIAGRA	SILDENAFIL	טיפול בבעיות זקפה	מותר להתרים 12 שעות לאחר הטיפול
ויה-אבניר	VIA-AVENIR	SILDENAFIL	טיפול בבעיות זקפה	מותר להתרים 12 שעות לאחר הטיפול
ויואנס	VYVANSE	LISDEXAMFETAMINE	טיפול בהפרעות קשב ופעלתנות יתר (ADHD)	מותר להתרים
ויזאבל	VISABELLE	DIENOGEST	טיפול באנדומטריוזיס	מותר להתרים
ויפאקס	VIEPAX	VENLAFAXINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
ויפריב	VPRIV	VELAGLUCERASE ALFA	טיפול במחלת גושה	אסור להתרים
ויקטוזה	VICTOZA	LIRAGLUTIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים 24 שעות לאחר הזריקה
ולטרקס	VALTREX	VALCICLOVIR	טיפול מניעתי נגד הרפס	מותר להתרים
ולטרקס	VALTREX	VALCICLOVIR	טיפול בהרפס	מותר להתרים לאחר החלמה (ראה הנחיות)
ולפורל	VALPORAL	VALPROIC ACID	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
ולציקלוביר	VALACICLOVIR	VALACICLOVIR	טיפול בהרפס	מותר להתרים לאחר החלמה (ראה הנחיות)
ונורוטון	VENORUTON	MONOXERUTIN	טיפול בדליות ברגליים	מותר להתרים
ונטולין	VENTOLIN	SALBUTAMOL	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
ונלפאקסין	VENLAFAXINE	VENLAFAXINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
וסיקר	VESICARE	SOLIFENACIN	טיפול בשלפוחית שתן רגיזה	מותר להתרים אם אין עדות/חשד לדלקת
וסקסטן	VASEXTEN	BARNIDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
וקטור	VECTOR	VALSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
וקטור	VECTOR	VALSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
ורמוקס	VERMOX	MEBENDAZOLE	טיפול בתולעים	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
ורפרס	VERAPRESS	VERAPAMIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
ורפרס	VERAPRESS	VERAPAMIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
זאוס	ZEUS	SILDENAFIL	הפרעות בזקפה	מותר להתרים 12 שעות לאחר הטיפול
זאלדיאר	ZALDIAR	PARACETAMOL, TRAMADOL	נגד כאבים	לפנות לבירור לסמכות רפואית
זאפה	ZAPPA	OLANZAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
זבסקה	ZAVESCA	MIGLUSTAT	טיפול במחלת גושה	אסור להתרים
זואלי	ZOELY	ESTRADIOL, NOMEGESTROL	למניעת הריון	מותר להתרים
זובירקס	ZOVIRAX	ACYCLOVIR	טיפול מניעתי נגד הרפס	מותר להתרים
זובירקס	ZOVIRAX	ACYCLOVIR	טיפול בהרפס	מותר להתרים לאחר החלמה (ראה הנחיות)

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	הנחיות להחלמה
זודורם	ZODORM	ZOLPIDEM	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
זוטון	ZOTON	LANSOPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
זולאיר	XOLAIR	OMALIZUMAB	טיפול באסטמה אלרגית / אורטיקריה	כפוף לחומרת המחלה, לפנות לבירור סמכות רפואית
זומיג	ZOMIG	ZOLMITRIPTAN	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרים 24 שעות לאחר ההתקף
זופיקלון	ZOPICLONE	ZOPICLONE	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
זטו	ZETO	AZITHROMYCIN	אנטיביוטיקה	אנטיביוטיקה
זיבן	ZYBAN	BUPROPION	להפסקת עישון	מותר להתרים
זילרג'י	ZYLLERGY	CETIRIZINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
זינט	ZINNAT	CEFUROXIME	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
זיפקסה	ZYPREXA	OLANAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
זנטק	ZANTAC	RANITIDINE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
זרוקסולין	ZAROXOLIN	METOLAZONE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
זרוקסולין	ZAROXOLIN	METOLAZONE	טיפול באי ספיקת לב, הפרעה בתיפקוד כליתי	אסור להתרים
זרידקס	ZARIDEX	RANITIDINE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
חומצה פולית	FOLIC ACID	FOLIC ACID	טיפול באנמיה, טיפול מניעתי טרום ובמהלך הריון	מותר להתרים בהתאם למחלה/ מצב רפואי
טאבניק	TAVANIC	LEVOFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
טבאלפא	TEVALFA	ALFACALCIDOL	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
טבענט	TEVANATE	ALENDRONATE	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
טבעפירין	TEVAPIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	דילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
טבעציקלין	TEVACYCLINE	TETRACYCLINE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
טגאמט	TAGAMET	CIMETIDINE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
טגיסון	TEGISON	ETRETINAT	טיפול בפסוריאזיס קשה	אסור להתרים
טגרטול	TEGRETOL	CARBAMAZEPINE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
טגרטול	TEGRETOL	CARBAMAZEPINE	טיפול בנוירלגיה טריג'מינל	מותר להתרים
טגרטול	TEGRETOL	CARBAMAZEPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
טוביאז	TOVIAZ	FESOTERODINE	טיפול בדחיסות במתן שתן, בשלפוחית שתן רגיזה	מותר להתרים אם אין עדות/חשד לדלקת
טולטרודין	TOLTERODINE	TOLTERODINE	טיפול בבריחת שתן	מותר להתרים
טוניט	TONIGHT	DOXYLAMINE	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
טופיראמט	TOPIRAMATE	TOPIRAMATE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
טופיראמט	TOPIRAMATE	TOPIRAMATE	למניעת התקפי מיגרנה	מותר להתרים
טופיתרים	TOPITRIM	TOPIRAMATE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
טופיתרים	TOPITRIM	TOPIRAMATE	למניעת התקפי מיגרנה	מותר להתרים
טופמקס	TOPAMAX	TOPIRAMATE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
טופמקס	TOPAMAX	TOPIRAMATE	למניעת התקפי מיגרנה	מותר להתרים
טופרניל	TOFRANIL	IMIPRAMINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
טוקטינו	TOCTINO	ALITRETINOIN	טיפול באקזמה קשה	מותר להתרים חודש לאחר סיום הטיפול
טיאסר	TIASAR	LOSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
טיאסר	TIASAR	LOSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
טייק אייר	TAKE AIR	MONTELUKAST	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
טימוניל	TIMONIL	CARBAMAZEPINE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
טימוניל	TIMONIL	CARBAMAZEPINE	טיפול בנוירלגיה טריג'מינל	מותר להתרים
טימוניל	TIMONIL	CARBAMAZEPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
טיקלופידין	TICLOPIDINE	TICLOPIDINE	דילול דם	מותר להתרים בהתאם למצב הרפואי. לא לטסיות.
טירן	TIRAN	ACETYLCYSTEINE	מכ"ח/טיפול בשיעול וליחה	מותר להתרים לאחר החלמה
טלפסט	TEFAST	FEXOFENADINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
טמבוקור	TAMBOCOR	FLECAINIDE	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בשכרית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	ההנחיות לתרופה
טמיגרן	TEMIGRAN	CAFFEINE, ERGOTAMINE, CODEINE	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרים אם ללא התקף ביום התרומה
טמפלול	TAMIFLU	OSELTAMIVIR	טיפול ומניעת שפעת	מותר להתרים לאחר החלמה/ 3 ימים לאחר סיום טיפול
טמסולוסין	TAMSULOSIN	TAMSULOSIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
טמסולין	TAMSULIN	TAMSULOSIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
טנסופריל	TENSOPRIL	LISINOPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
טנסופריל	TENSOPRIL	LISINOPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
טקפידרה	TECFIDERA	DIMETHYL FUMARATE	טיפול בטרשת נפוצה	אסור להתרים
טרבולין	TERBULIN	TERBUTALIN	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
טרבינאפין	TERBINAFINE	TERBINAFINE	טיפול בפטרת בעור וציפורניים	מותר להתרים
טרגין	TARGIN	NALOXONE, OXYCODONE	טיפול בכאבים חזקים	לפנות לסמכות רפואית
טרגין	TARGIN	OXYCODONE, NALOXONE	נגד כאבים	לפנות לסמכות רפואית
טרג'נטה	TRAJENTA	LINAGLIPTIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
טרובלט	TROBALT	RETIGABINE	טיפול בהתכווצויות ואפילפסיה	אסור להתרים
טרודיל	TRAZODIL	TRAZODONE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
טרזוסין	TERAZOSIN	TERAZOSIN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
טרזוסין	TERAZOSIN	TERAZOSIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
טריבמין	TRIBEMIN	VITAMIN B12, B6, B1	תוסף מזון	מותר להתרים
טריבמין	TRIBEMIN	VITAMIN B12, B6, B1	טיפול בנוירופטיה	לפנות לבירור לסמכות רפואית
טריבמין	TRIVITAMIN	B6, B12, FOLIC ACID	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
טריטאס	TRITACE	RAMIPRIL	טיפול בעודף הומוציסטאין בדם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
טריטאס	TRITACE	RAMIPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	אסור להתרים
טריל	TERIL	CARBAMAZEPINE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
טריל	TERIL	CARBAMAZEPINE	טיפול בנוירלגיה טריג'מין	מותר להתרים
טריל	TERIL	CARBAMAZEPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
טרילפטין	TRILEPTIN	OXCARBAZEPINE	טיפול באפילפסיה/התכווצויות	אסור להתרים
טרימקסול	TRIMEXOL	PRAMIPEXOLE	טיפול במחלת פרקינסון	סיכון לירידת לחץ דם, מותר להתרים בהתאם למצבו התורם. לוודא שתייה, למדוד ל"ד ודופק 15 דקות לאחר תרומה
טריסקוונס	TRISEQUENS	ESTRADIOL, NORETHISTERONE	טיפול הורמונלי בגיל המעבר (HRT)	מותר להתרים
טריקאן	TRICAN	FLUCONAZOLE	טיפול בפטרת בעור, ציפורניים ונרתיק	מותר להתרים
טרמדקס	TRAMADOL	TRAMADOL	נגד כאבים	לפנות לסמכות רפואית
טרמל	TRAMAL	TRAMADOL	נגד כאבים	לפנות לסמכות רפואית
טרנדייט	TRANDATE	LABETALOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק
טרנטל	TRENTAL	PENTOXIFYLLINE	טיפול בבעיות בכלי הדם	מותר להתרים בהתאם למצב הרפואי
טרנקסל	TRANXAL	DIPOTASSIUM CLORAZEPATE	להרגעה	מותר להתרים
טרנקסל	TRANXAL	POTASSIUM CLORAZEPATE	טיפול בבעיות נפשיות, גמילה מאלכוהול, התכווצויות	לפנות לסמכות רפואית
טרקליר	TRACLEER	BOSENTAN	מחלות אוטואימוניות עם מעורבות ריאתית או כיבים בגפיים	אסור להתרים
טרקספין	TREXAPIN	OXCARBAZEPINE	טיפול באפילפסיה/התכווצויות	אסור להתרים
יטירוקס	EUTHYROX	LEVOTHYROXINE	טיפול בתת פעילות של בלוטת התריס	מותר להתרים אם תיקופד בלוטת התריס תקינים
ימירה	HUMIRA	ADALIMUMAB	טיפול אימונוסופריבי	אסור להתרים
יוקריאס	EUCREAS	METFORMIN, VIDAGLIPTIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
ינטריב	YENTREVE	DULOXETINE	טיפול בבריחת שתן	מותר להתרים אם אין עדות/חשד לדלקת
כדורי ברזל	IRON TABLETS	FERROUS SULPHATE	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח לתיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
כולסטגל	CHOLESTAGEL	COLESEVELAM	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
כולסטיד	COLESTID	COLESTIVOL	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
לאנוקסין	LANOXIN	DIGOXIN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
לאייף 600	LAIF 600	HYPERICUM PERFORATUM	טיפול בדכאון	מותר להתרים
לבו	LEVO	LEVOFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	ההחלטה
לבוֹפֿלוֹקְסָצִין	LEVOFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
לבופר	LEVOPAR	BENSERAZIDE, LEVODOPA	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
לבטיראצטם	LEVETIRACETAM	LEVETIRACETAM	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
לודוסרה	LODOTRA	PREDNISONE	טיפול במחלות אוטואימוניות, התקפי אסטמה/ אלרגיה	אסור להתרים במהלך הטיפול, לתרומות עתידיות לפנות לסמכות רפואית
לוותרים	LEVETRIM	LEVETIRACETAM	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
לזפין	LOZAPINE	CLOZAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שהתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
לוטן	LOTAN	LOSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
לוטן	LOTAN	LOSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
לויטרה	LEVITRA	VARDENAFIL	טיפול בהפרעות זקפה	מותר להתרים 12 שעות לאחר הטיפול
לוטרל	LUSTRAL	SERTRALINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
לוסק	LOSEC	OMEPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה או תריסרון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמגולובין תקין
לוסרדקס	LOSARDEX	LOSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
לוסרדקס	LOSARDEX	LOSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
לוסרטה פלוס	LOSARTA PLUS	HYDROCHLOROTHIAZIDE, LOSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
לוסרטה פלוס	LOSARTA PLUS	HYDROCHLOROTHIAZIDE, LOSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
לוטרטן	LOSARTAN	LOSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
לוטרטן	LOSARTAN	LOSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
לופי-קאר	LOPI-CARE	LOPERAMIDE	נגד שלשולים	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
לופריד	LOPERID	LOPERAMIDE	נגד שלשולים	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
לופריום	LOPERIUM	LOPERAMIDE	טיפול בשלשול	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
לופרמיד	LOPERAMIDE	LOPERAMIDE	טיפול בשלשול	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
לופרסור	LOPRESOR	METOPROLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
לופרסור	LOPRESOR	METOPROLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק
לופרקס	LOPREX	LOPERAMIDE	נגד שלשולים	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
לוקסאויט	LOXAVIT	CLOXACILLIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
לוקסאר	LOXAR	LOSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
לוקסאר	LOXAR	LOSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
לורטדין	LORATADINE	LORATADINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
לוריוון	LORIVAN	LORAZEPAM	טיפול בחרדה	מותר להתרים
לורסטין	LORASTINE	LORATADINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
לורתרימ	LORATRIM	LORATADINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
ליואל	LIVIAL	TIBOLONE	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
ליורל	LIORESAL	BACLOFEN	טיפול בקשייון בשרירים (ספסטיות)	לפנות לבירור לסמכות רפואית
ליטורבה	LITORVA	ATORVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
ליפיטור	LIPITOR	ATORVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
ליפנור	LIPANOR	CIPROFIBRATE	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
ליקארביום	LICARBUM	LITHIUM	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
ליקסומיה	LYXUMIA	LIXISENATIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים 24 שעות לאחר הזריקה
לירניל	LYRINEL	OXYBUTYNIN	טיפול בתסמינים של כיס שתן נירוגני	מותר להתרים
ליריקה	LYRICAL	PREGABALIN	טיפול בכאב נירופטי	לפנות לבירור לסמכות רפואית
למוג'ין	LAMOGINE	LAMOTRIGINE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
למוג'ין	LAMOGINE	LAMOTRIGINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
למודקס	LAMODEX	LAMOTRIGINE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
למודקס	LAMODEX	LAMOTRIGINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
למוטריג'ין	LAMOTRIGINE	LAMOTRIGINE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
למוטריג'ין	LAMOTRIGINE	LAMOTRIGINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
למידיל	LAMISIL	TERBINAFINE	טיפול בפטרת בעור וציפורניים	מותר להתרים
למיקטל	LAMICTAL	LAMOTRIGINE	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
למיקטל	LAMICTAL	LAMOTRIGINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	הנחיות להחלמה
לנטון	LANTON	LANSOPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
לניטין	LENITIN	BROMAZEPAM	טיפול בחרדה	מותר להתרים
לנסו	LANSO	LANSOPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
לנסופרזול	LANSOPRAZOLE	LANSOPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
לסכול	LESCOL	FLUVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
לפונקס	LEPONEX	CLOZAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שהתרם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
לקסטיב מורכב	LAXATIVE COMPOUND	ALOE, ALOIN	טיפול בעצירות	מותר להתרים
לקסעדן	LAXADIN	BISACODYL	טיפול בעצירות	מותר להתרים
לרקאנידיפין	LERCANIDIPINE	LERCANIDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
לרקפרס	LERCAPRESS	LERCANIDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
סורמונטיל	SURMONTIL	TRIMIPRAMINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
סימביקורט	SYMBICORT	BUDESONIDE, FORMOTEROL	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
מגאקסין	MEGAXIN	MOXIFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
מדיקינט	MEDIKINET	METHYLPHENIDATE	טיפול בהפרעות קשב ופעלתנות יתר	מותר להתרים
מדורל	MEDROL	METHYLPREDNISOLONE	טיפול במחלות אוטואימוניות, התקפי אסטמה/ אלרגיה	אסור להתרים במהלך הטיפול, לתרומות עתידיות לפנות לסמכות רפואית
מודאל	MODAL	SULPIRIDE	טיפול בכיב קיבה	מותר להתרים אם אין עדות לדימום, המוגלובין תקין
מודאל	MODAL	SULPIRIDE	טיפול בסחרחורת	מותר להתרים לאחר סיום הטיפול ובהתאם למצב הרפואי
מווקס	MOVEX	BROMHEXINE	מכייח/טיפול בשיעול וליחה	מותר להתרים לאחר החלמה
מוטיליום	MOTILUM	DOMPERIDONE	טיפול באי נוחות במערכת העיכול	מותר להתרים אם אין עדות לגסטרואנטריטיס חריפה
מולטאק	MULTAQ	DRONEDARONE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
מונולונג	MONOLONG	ISOSORBIDE	טיפול במחלות לב	אסור להתרים
מונוניט	MONONIT	ISOSORBIDE	טיפול במחלות לב	אסור להתרים
מונוקורד	MONOCORD	ISOSORBIDE	טיפול במחלות לב	אסור להתרים
מונוורל	MONUROL	FOSFOMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
מונטהלוקאסט	MONTELUKAST	MONTELUKAST	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
מוסקול	MUSCOL	ORPHENADRINE, PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים
מוקולס	MUCOLESS	BROMHEXINE	מכייח/טיפול בשיעול וליחה	מותר להתרים לאחר החלמה
מוקסיוויט	MOXYVIT	AMOXYCILLIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
מוקסיפן	MOXYPEN	AMOXYCILLIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
מטפורמין	METFORMIN	METFORMIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
מטרג'ין	METHERGIN	METHYLERGOMETRINE	טיפול /מניעת דימום רחמי	לפנות לסמכות רפואית
מטרוג'יל	METROGYL	METRONIDAZOLE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
מיגרלב	MIGRALEVE	BUCLIZINE, CODEINE, PARACETAMOL	למניעה וטיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרים אם ללא התקף ביום התרומה
מיזולן	MIZOLLENE	MIZOLASTINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
מילפוניד	MILFONIDE	BUDESONIDE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
מימפרה	MIMPARA	CINACALCET	טיפול בפעילות יתר של בלוטת יותרת	אסור להתרים
מינוציקלין	MINOCYCLINE	MINOCYCLINE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
מינוציקלין	MINOCYCLINE	MINOCYCLINE	טיפול באקנה	מותר להתרים
מינוקלין	MINOCLIN	MINOCYCLINE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
מינוקלין	MINOCLIN	MINOCYCLINE	טיפול באקנה	מותר להתרים
מינוקסידיל	MINOXIDIL	MINOXIDIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
מינירין	MINIRIN	DESMOPRESSIN	טיפול בסכרת תפלה	אסור להתרים
מינירין	MINIRIN	DESMOPRESSIN	טיפול בהרבת לילה	מותר להתרים
מיפאר	MIPHAR	FUROSEMIDE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	המחלות להחברה
מיפאר	MIPHAR	FUROSEMIDE	טיפול במחלות לב, כבד, כליות	אסור להתרים
מיקובוטין	MYCOBUTIN	RIFABUTIN	טיפול בשחפת	אסור להתרים
מיקרדיס	MICARDIS	TELMISARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
מיקרופירין	MICROPIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
מירו	MIRO	MIRTAZAPINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
מירטאזאפין	MIRTAZAPINE	MIRTAZAPINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים
מכבימול	MACCABIMOL	PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים
מכבימול	MACCABIMOL	PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
מלודיל	MELODIL	MAPROTILINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
מסוליד	MESULID	NIMESULIDE	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
מסוליד	MESULID	NIMESULIDE	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
מסטינון	MESTINON	PYRIDOSTIGMINE	טיפול במיאסטניה גרביס	אסור להתרים
מפרן	MEPRO	MEPROBAMATE	טיפול בחרדה והפרעות שינה	מותר להתרים
מקסיבון	MAXIBONE	ALENDRONATE	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
מרוניל	MARONIL	CLOMIPRAMINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
מרקפטזול	MERCAPTIZOL	METHIMAZOLE	טיפול בפעילות יתר של בלוטת התריס	מותר להתרים אם תיפקודי בלוטת התריס תקינים
מתוזאן	METHOZANE	METHOTRIMEPRAZINE	להרגעה	מותר להתרים
מתוטקסאט	METHOTREXATE	METHOTREXATE	טיפול במחלות ממאירות, אוטואימוניות ואחרות	אסור להתרים
מתילפנובארביטאל	METHYLPHENOBARBITAL	METHYLPHENOBARBITAL	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
מתילפנובארביטאל	METHYLPHENOBARBITAL	METHYLPHENOBARBITAL	טיפול בהתכווצויות/אפילפסיה	אסור להתרים
נאופרו	NEUPRO	ROTIGOTINE	טיפול במחלת פרקינסון	סיכון לירידת לחץ דם, מותר להתרים בהתאם למצבו התורם. לוודא שתייה, למדוד ל"ד ודופק 15 דקות לאחר תרומה
נאורונטין	NEURONTIN	GABAPENTIN	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
נאורונטין	NEURONTIN	GABAPENTIN	טיפול בכאב נירופטי	לפנות לבירור לסמכות רפואית
נבוקו	NABUCO	NABUMETONE	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
נבוקו	NABUCO	NABUMETONE	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
נובוגרד	NOVOGARD	METFORMIN, REPAGLINIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
נובונורם	NOVONORM	REPAGLINIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
נובופם	NOVOFEM	ESTROGENE, NORETHISTERONE	טיפול הורמונלי בגיל המעבר (HRT)	מותר להתרים
נוביטרופן	NOVITROPAN	OXYBUTYNIN	טיפול בתסמינים של כיס שתן נירוגני	מותר להתרים
נובריל	NOVERIL	DIBENZEPIN	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
נודקסטה	NUDEXTA	DEXTROMETHORPHAN, QUINIDINE	טיפול לאחר אירוע מוחי	אסור להתרים
נוטנסיל	NOTENSYL	DICYCLOMINE	טיפול במעי רגז	מותר להתרים
נוילפטיל	NEULEPTIL	PERICYAZINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
נומבון	NUMBON	NITRAZEPAM	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
נופן	NOPAN	BUPRENORPHINE	כאב, טיפול חלופי לתלות באופיאטים	יש לפנות לסמכות רפואית
נוקטורנו	NOCTURNO	ZOPICLONE	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
נורוסק	NORVASC	AMLODIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
נורוסק	NORVASC	AMLODIPINE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
נורופן	NUROFEN	IBUPROFEN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
נורופן	NUROFEN	IBUPROFEN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
נורופן	NUROFEN	IBUPROFEN	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
נורטילין	NORTYLIN	NORTRIPTYLIN	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
נוריס	NORIT	CHARCOAL	טיפול באי נוחות במע' העיכול	מותר להתרים
נוריס	NORIT	CHARCOAL	טיפול בשלשולים	מותר להתרים 7 ימים לאחר החלמה
נורליפ	NORLIP	BEZAFIBRATE	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
נורמופרסאן	NORMOPRESAN	CLONIDINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
נורמיטן	NORMITEN	ATENOLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	ההנחיות להתרומה
נורמיתן	NORMITEN	ATENOLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרם
נורמלול	NORMALOL	ATENOLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק
נורמלול	NORMALOL	ATENOLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרם
נורפרולק	NORPROLAC	QUINAGOLIDE	טיפול בעודף פרולקטין בדם	יש לפנות לסמכות רפואית
ניאובלוק	NEOBLOC	METOPROLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק
ניאובלוק	NEOBLOC	METOPROLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרם
ניאוטיגאזון	NEOTIGASON	ACITRETIN	טיפול בפסוריאזיס קשה	מותר להתרם 3 שנים לאחר סיום הטיפול
ניאספן	NIASPAN	NIACIN	טיפול בעודף שומנים בדם	מותר להתרם
ניזורל	NIZORAL	KETOCONAZOLE	טיפול בפטרת בציפורניים	מותר להתרם
ניטן	NITAN	PEMOLINE	טיפול בהפרעות קשב ופעלתנות יתר (hyperactivity)	מותר להתרם
נייטול	NYTOL	DIPHENHYDRAMINE	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרם
ניסטטין	NYSTATIN	NYSTATIN	טיפול בפטרת	מותר להתרם אם הפטרת בעור או בנרתיק בלבד
ניפדילונג	NIFEDILONG	NIFEDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן
ניפדילונג	NIFEDILONG	NIFEDIPINE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרם
ניפדיפין	NIFEDIPINE	NIFEDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן
ניפדיפין	NIFEDIPINE	NIFEDIPINE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרם
נירבקסל	NIRVAXAL	CHLORDIAZEPOXIDE	טיפול באי נוחות במע' העיכול, מעי רגז	מותר להתרם אם אין עדות לגסטראנטריטיס חריפה
נפרוקסי	NAPROXI	NAPROXEN	טיפול נגד כאבים	מותר להתרם. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
נפרוקסי	NAPROXI	NAPROXEN	טיפול בדלקת	אסור להתרם אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
נפרוקסן	NAPROXEN	NAPROXEN	נגד חום	מותר להתרם לאחר החלמה
נפרוקסן	NAPROXEN	NAPROXEN	טיפול בדלקת	אסור להתרם אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
נפרוקסן	NAPROXEN	NAPROXEN	טיפול נגד כאבים	מותר להתרם. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
נקסיום	NEXIUM	ESOMEPRASOLE	טיפול בכיב קיבה, רפלוקס, הליקובקטר	מותר להתרם אם אין עדות לדימום והמולובין תקין
נקסין	NAXYN	NAPROXEN	טיפול נגד כאבים	מותר להתרם. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
נקסין	NAXYN	NAPROXEN	טיפול בדלקת	אסור להתרם אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
נרוסין	NAROCIN	NAPROXEN	טיפול נגד כאבים	מותר להתרם. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
נרוסין	NAROCIN	NAPROXEN	טיפול בדלקת	אסור להתרם אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
נרוסין	NAROCIN	NAPROXEN	נגד חום	מותר להתרם לאחר החלמה
נרמיג	NARAMIG	NAROTRIPTAN	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרם אם ללא התקף ביום התרומה
סאפריס	SAPHRIS	ASENAPINE	טיפול בסכיזופרניה ובעיות נפשיות שונות	יש לפנות לסמכות רפואית
סברילן	SABRILAN	VIGABATRIN	טיפול באפילפסיה	אסור להתרם
סובוטקס	SUBUTEX	BUPRENORPHINE	כאב, טיפול חלופי לתלות באופיאטים	יש לפנות לסמכות רפואית
סובוקסון	SUBOXONE	BUPRENORPHINE, NALOXONE	טיפול חלופי לתלות באופיאטים	יש לפנות לסמכות רפואית
סוטלול	SOTALOL	SOTALOL	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרם
סולבקס	SOLVEX	BROMHEXINE	מכ"ח/טיפול בשיעול וליחה	מותר להתרם לאחר החלמה
סוליאן	SOLIAN	AMISULPRIDE	טיפול בסכיזופרניה	יש לפנות לסמכות רפואית
סולifenאסין	SOLIFENACIN	SOLIFENACIN	טיפול בדחיסות במתן שתן	מותר להתרם
סומאטריפטן	SUMATRIPTAN	SUMATRIPTAN	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרם אם ללא התקף ביום התרומה
סומטרידקס	SUMATRIDEX	SUMATRIPTAN	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרם אם ללא התקף ביום התרומה
סופרמול	SUPRAMOL	PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרם
סופרמול	SUPRAMOL	PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרם לאחר החלמה
סורבון	SORBON	BUSPIRONE	טיפול במצבי חרדה	מותר להתרם. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצון
סורמונטיל	SURMONTIL	TRIMIPRAMINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרם. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצון
סטאבניר	STAVENIR	PRAVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרם
סטאלבו	STALEVO	CARBIDOPA, LEVODOPA, ENTACAPONE	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרם בהתאם למצבו התורם
סטונרון	STUNARONE	CINNARIZINE	טיפול בסחרחורות / מחלת מנייר	מותר להתרם בהתאם למחלה/ מצב רפואי
סטופיט	STOPIT	LOPERAMIDE	נגד שלשולים	מותר להתרם שבע לאחר החלמה

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	ההחלטה
סטטור	STATOR	ROSUVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
סטילנוקס	STILNOX	ZOLPIDEM	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
סטלרה	STELARA	USTEKINUMAB	טיפול בפסוריאזיס קשה	מותר להתרים
סטרוקורט	STERO-CORT	TRIAMCINOLONE	טיפול במצבים אלרגיים חריפים	מותר להתרים לאחר החלמה
סילאליס	CIALIS	TADALAFIL	הפרעות בזקפה	מותר להתרים
סידאלין	CIDALIN	MEBHYDROLIN	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
סילאזפריל	CILAZAPRIL	CILAZAPRIL	טיפול בבעיות לב	מותר להתרים
סילאזפריל	CILAZAPRIL	CILAZAPRIL	טיפול בלחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
סילדנאפיל	SILDENAFIL	SILDENAFIL	הפרעות בזקפה	מותר להתרים 12 שעות לאחר הטיפול
סילדקס	SILDEX	SILDENAFIL	הפרעות בזקפה	מותר להתרים 12 שעות לאחר הטיפול
סילריל	CILARIL	CILAZAPRIL	טיפול בלחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
סילריל	CILARIL	CILAZAPRIL	טיפול בבעיות לב	מותר להתרים
סימבאלטה	CYMBALTA	DULOXETINE	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
סימבאלטה	CYMBALTA	DULOXETINE	כאב נירופטי בחולי סכרת	יש לפנות לסמכות רפואית
סימבסטטין	SIMVASTATIN	SIMVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
סימבוקור	SIMVACOR	SIMVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
סימבוסון	SIMVAXON	SIMVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
סימוביל	SIMOVIL	SIMVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
סימזיה	CIMZIA	CERTOLIZUMAB	טיפול בדלקת פרקים פעילה	מותר להתרים
סימידונה	CIMIDONA	CIMICIFUGAE RHIZOMA EXTRACT	טיפול בתופעות של גיל המעבר	מותר להתרים
סימפוני	SIMPONI	GOLIMUMAB	טיפול אימונוסופרסיבי	מותר להתרים
סינגוליר	SINGULAIR	MONTELUKAST	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
סינטרום	SINTROM	ACENOCUMAROL	נגד קרישה	מותר להתרים
סינמט	SINEMET	CARBIDOPA, LEVODOPA	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
סינתרויד	SYNTHROID	LEVOTHYROXINE	טיפול בתת פעילות של בלוטת התריס	מותר להתרים אם תפקוד בלוטת התריס תקין
סיפולקס	CIPLOX	CIPROFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
סיפרול	SIFROL	PRAMIPEXOLE	טיפול במחלת פרקינסון	סיכון לירידת לחץ דם, מותר להתרים בהתאם למצבו התורם. לוודא שתייה, למדוד ל"ד ודופק 15 דקות לאחר תרומה
סירן	SIRAN	ACETYL CYSTEINE	מכייח/טיפול בשיעול וליחה	מותר להתרים לאחר החלמה
סירקדין	CIRCADIN	MELATONIN	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
סלאזופירין	SALAZOPYRINE	SULPHASALAZINE	טיפול במחלת קרוהן וקוליטיס מכוויבית (Ulcerative Colitis)	מותר להתרים
סלברה	CELEBRA	CELECOXIB	טיפול נגד כאבים, בעיקר בעצמות ופרקים	מותר להתרים. לא לטרוםבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
סלג'ילין	SELEGILINE	SELEGILINE	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
סלגן	SALAGEN	PILOCARPINE	טיפול בסרטן ותסמונת סיוגרן	מותר להתרים
סלופה	SLOW-FE	FERROUS SULPHATE	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח תיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
סלואו דרלין	SLOW DERALIN	PROPRANOLOL	טיפול בלחץ דם, מניעת התקפי מיגרנה, רעידות בלתי רצויות	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן - יש לבדוק דופק
סלואו דרלין	SLOW DERALIN	PROPRANOLOL	טיפול בבעיות לב	מותר להתרים
סלינקרו	SELINCRO	NALMEFENE	טיפול בצריכת יתר של אלכוהול	יש לפנות לסמכות רפואית
סליפ איד	SLEEP AID	DOXYLAMINE	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
סליקוקס	CELCOX	CELECOXIB	טיפול נגד כאבים, בעיקר בעצמות ופרקים	מותר להתרים. לא לטרוםבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
סליקוקסיב	CELECOXIB	CELECOXIB	טיפול נגד כאבים, בעיקר בעצמות ופרקים	מותר להתרים. לא לטרוםבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
סמידין	CEMIDIN	CIMETIDINE	טיפול בכיב קיבה ותריסרון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
סנדאיימון ניאורל	SANDIMMUN NEORAL	CICLOSPORIN	מדכא מערכת החיסונית	מותר להתרים
סנסמול	SENSAMOL	PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים
סנסמול	SENSAMOL	PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
ספורנוקס	SPORANOX	ITRACONAZOLE	טיפול בפטרת בעור וציפורניים	מותר להתרים
ספזמ-ליט	SPASMO-LIT	TROSPIMUM	טיפול בשלפוחית רגילה וברירת שתן	מותר להתרים בהתאם למחלה/ מצב רפואי

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	המחלות להחממה
ספזמון	SPASMOMEN	OTILONIUM	טיפול בתסמונת המעי הרגיז	מותר להתרים אם אין עדות לגסטרואנטריטיס חריפה
ספזמקס	SPASMEX	TROSPIMUM	טיפול בשלפוחית רגזיה ובריחת שתן	מותר להתרים בהתאם למחלה/ מצב רפואי
ספירונול	SPIRONOL	SPIRONOLACTONE	משנת/דיורטיקה	מותר להתרים בהתאם למחלה/ מצב רפואי ולחץ דם מאוזן
ספיריבה	SPIRIVA	TIOTROPIUM	טיפול ב COPD	מותר להתרים אם אין קוצר נשימה במאמץ קל ו/או מחלה חריפה
ספסמלגין	SPASMALGIN	ATROPINE, CODEINE, PAPAVERINE, PARACETAMOL	טיפול בכאב עוויתי במערכת העיכול/כליות	יש לפנות לסמכות רפואית
ספרידון	SPERIDONE	RISPERIDONE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
סקטרל	SECTRAL	ACEBUTOLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
סקטרל	SECTRAL	ACEBUTOLOL	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים
סרבנט דיסקוס	SEREVENT DISKUS	SALMETEROL	טיפול באסטמה /ברונכיטיס כרונית	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
סרדולקט	SERDOLECT	SERTINDOLE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
סרוקואל	SEROQUEL	QUETIAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
סרוקסט	SEROXAT	PAROXETINE	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
סרוקסים	CEROXIM	CEFUROXIME	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
סרטז	CERAZETTE	DESOGESTREL	גלולות מניעת הריון	מותר להתרים
סרטייד דיסקוס	SERETIDE DISKUS	FLUTICASONE, SALMETEROL	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
סרטלין	SERTRALINE	SERTRALINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
סרנה	SERENADA	SERTRALINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
עצירות X	ATZIRUT X	BISACODYL	טיפול בעצירות	מותר להתרים
עורבה	ARAVA	LEFLUNOMIDE	טיפול בראומטואיד או פסורואטיק ארטריטיס	אסור להתרים
פאמו	FAMO	FAMOTIDINE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמולובין תקין
פאסיגין	FASIGYN	TINIDAZOLE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
פאקסט	PAXXET	PAROXETINE	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פארילק	PARILAC	BROMOCRIPTINE	טיפול ברמת פרולקטין גבוה	יש לפנות לסמכות רפואית
פבאוריק	FEBURIC	FEBUXOSTAT	טיפול בעודף חומצת אורית בדם	יש לפנות לסמכות רפואית
פבוקסיל	FAVOXIL	FLUVOXAMINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פוינט	POINT	NAPROXEN	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
פוינט	POINT	NAPROXEN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
פוינט	POINT	NAPROXEN	טיפול נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
פוסאוונס	FOSAVANCE	ALENDRONATE	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
פוסאלאן	FOSALAN	ALENDRONATE	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
פוסטנור	POSTINOR	LEVONORGESTREL	גלולות מניעת הריון	מותר להתרים
פוסיד	FUSID	FUROSEMIDE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
פוסיד	FUSID	FUROSEMIDE	טיפול באי ספיקת לב	אסור להתרים
פוסידין	FUCIDIN	SODIUM FUSIDATE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
פוסינופריל	FOSINOPRIL	FOSINOPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
פורסיגה	FORXIGA	DAPAGLIFLOZIN	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
פייקומפה	FYCOMPA	PERAMPANEL	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים.
פינסטרייד	FINASTERIDE	FINASTERIDE	טיפול בהגדלת הפרוסטטה שפירה	מותר להתרים חודש לאחר סיום הטיפול
פינסטרייד	FINASTERIDE	FINASTERIDE	טיפול בנשירת שער	מותר להתרים חודש לאחר סיום הטיפול
פירדפסה	FIRDAPSE	AMIFAMPRIDINE	טיפול בתסמונת יאטון-למברט	אסור להתרים
פירידוסטיגמין	PYRIDOSTIGMINE	PYRIDOSTIGMINE	טיפול במיאסטניה גריביס	אסור להתרים
פלאג'ל	FLAGYL	METRONIDAZOLE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
פלואנקסול	FLUANXOL	FLUPENTHIXOL	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פלובוקסמין	FLUVOXAMINE	FLUVOXAMINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פלוטין	FLUTINE	FLUOXETINE	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פלויקס	PLAVIX	CLOPIDOGREL	דילול דם	יש לפנות לסמכות רפואית. לא לטרומבוציטים
פלוקונזול	FLUCONAZOLE	FLUCONAZOLE	טיפול בפטרת בעור וציפורניים	מותר להתרים
פלוקונול	FLUCANOL	FLUCONAZOLE	טיפול בפטרת בעור וציפורניים	מותר להתרים

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בשבירת	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	החתימה להחלטה
פליקסוטייד משאף/דיסקוס פלדרן	FLIXOTIDE PLENADREN	FLUTICASONE HYDROCORTISONE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
פלדון	PLAQUENIL	HYDROXYCHLOROQUINE	טיפול באי ספיקה אדרנלית	יש לפנות לסמכות רפואית
פלוקווניל	PALEXIA	TAPENTADOL	טיפול בכאבים חזקים	אסור להתרים
פמוטידין	FAMOTIDINE	FAMOTIDINE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	יש לפנות לסמכות רפואית
פמיד	PAMID	INDAPAMIDE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
פמפירה	FAMPIRA	FAMPRIDINE	טיפול בטרשת נפוצה	אסור להתרים
פנאפט	FANAPT	ILOPERIDONE	טיפול בסכיזופרניה	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פנדיל	PENEDIL	FELODIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
פנדיל	PENEDIL	FELODIPINE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
פנברביון	PHENOBARBITONE	PHENOBARBITONE	טיפול בהפרעות שינה	מותר להתרים
פנטוקסיפילין	PENTOXIFYLLINE	PENTOXIFYLLINE	טיפול במחלת כלי דם היקפים	יש לפנות לסמכות רפואית
פנטסה	PENTASA	MESALAZINE	טיפול במחלת קרוהן וקוליטיס מכוייבית (Ulcerative Colitis)	אסור להתרים
פינטייל	FENISTIL	DIMETHINDENE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
פנקראופלט	PANCREOFLAT	DIMETICONE, PANCREATIN	טיפול באי נוחות במע' העיכול	מותר להתרים
פפברין	PAPAVERINE	PAPAVERINE	טיפול בכאב עוויתי	אסור להתרים אם ניתן למחלת מע' דלקתית חריפה או כרונית
פק-מרץ	PK- MERZ	AMANTADINE SULFATE	טיפול ומניעת מחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
פק-מרץ	PK- MERZ	AMANTADINE SULFATE	טיפול בשפעת	מותר להתרים לאחר סיום טיפול והחלמה מלאה
פקסופנאדין	FEXOFENADINE	FEXOFENADINE	טיפול בצדלת אלרגית	מותר להתרים
פראמול	PARAMOL	PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים
פראמול	PARAMOL	PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
פראמול טרגט	PARAMOL TARGET	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
פראמול טרגט	PARAMOL TARGET	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
פראמין	PRAMIN	METOCLOPRAMIDE	טיפול בבחילות, הקאות	אסור להתרים
פראמין	PRAMIN	METOCLOPRAMIDE	טיפול רפלוקס קיבה-ושט	מותר להתרים
פרבליפ	PRAVALIP	PRAVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
פרבסטאטין	PRAVASTATIN	PRAVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
פרגוליד	PERGOLIDE	PERGOLIDE	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
פרדיקס	PERDIX	MOEXIPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
פרדינזון	PREDNISONE	PREDNISONE	טיפול במחלות אוטואימוניות, התקפי אסטמה/אלרגיה	אסור להתרים במהלך הטיפול, לתרומות עתידיות לפנות לסמכות רפואית
פרדקסה	PRADAXA	DABIGATRAN	מניעת טרומבוזת לפני ניתוח אורטופדי	מותר להתרים לאחר ניתוח וסיום הטיפול
פרדקסה	PRADAXA	DABIGATRAN	טיפול מניעתי לחולים בפרפור פרוזדורים	אסור להתרים
פראבניר	PROAVENIR	FINASTERIDE	טיפול בנשירת שער	מותר להתרים חודש לאחר סיום הטיפול
פרוקור	PRO-CURE	FINASTERIDE	טיפול בהגדלת הפרוסטטה שפירה	מותר להתרים חודש לאחר סיום הטיפול
פרובר	PROVERA	MEDROXYPROGESTERONE	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
פרוגילוטון	PROGYLUTON	ESTRADIOL, NORGESTREL	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
פרוגינובה	PROGINOVA	ESTRADIOL	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
פרוגרגומט	FERROGRADUMET	IRON	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח תיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
פרוגרד פוליק	FERROGRAD FOLIC	FOLIC ACID, IRON	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח תיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
פרויג'יל	PROVIIGIL	MODAFINIL	טיפול בהפרעות שינה (נרקולפסיה)	אסור להתרים
פרוויורן	PROVIRON	MESTEROLONE	טיפול הורמונלי לגברים	מותר להתרים
פרוזק	PROZAC	FLUOXETINE	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פרוטופיק	PROTOPIC	TACROLIMUS	טיפול בדמטיטיס קשה	אסור להתרים
פרוטוציד	PROTOCIDE	TINIDAZOLE	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
פרוטיאזין	PROTHIAZINE	PROMETHAZINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	הנחיות להחרמה
פרוטיאזין	PROTHIAZINE	PROMETHAZINE	נגד הקאות	לפנות לבירור לסמכות רפואית
פרוטיאזין	PROTHIAZINE	PROMETHAZINE	להרגעה	מותר להתרים
פרוסטלוס	PROTELOS	STRONTIUM	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים
פרוטין	PAROTIN	PAROXETINE	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פרולול	PROLOL	PROPRANOLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן - יש לבדוק דופק
פרולול	PROLOL	PROPRANOLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
פרומניקס	PROMNIX	TAMSULOSIN	טיפול בהגדלת הפרוסטטה שפירה	מותר להתרים
פרונל	FERRONAL	IRON	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח לתיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
פרופיטן	PROFITEN	KETOTIFEN	טיפול מונע באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
פרופיטן	PROFITEN	KETOTIFEN	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
פרופיל תיצייל	PROPYL-THIOCIL	PROPYLTHIOURACIL	טיפול בפעילות יתר של בלוטת התריס	מותר להתרים אם מאוזן
פרופניד	PROFENID	KETOPROFEN	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
פרופניד	PROFENID	KETOPROFEN	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת פעילה, חריפה או כרונית
פרופסיה	PROPECIA	FINASTERIDE	טיפול בנשירת שער	מותר להתרים חודש לאחר סיום הטיפול
פרופקס	PROFEX	PROPAFENONE	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים
פרוקור	PROCOR	AMIODARONE	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים
פרוקל	FERROCAL	CALCIUM, IRON	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח לתיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
פרוקסול	PROXOL	DEXTROPROPOXYPHENE	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
פרוקסול	PROXOL	DEXTROPROPOXYPHENE	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
פרוקסול פורטה	PROXOL FORTE	PROPOXYPHENE	נגד כאבים	מותר להתרים
פרוקסטין	PAROXETINE	PAROXETINE	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פרטאן	PARTANE	BENZHEXOL	פרקינסונים וטיפול בת"ל אקסטרהפירמידיות משניות לטיפול	יש לפנות לסמכות רפואית
פרידור	PERIDOR	HALOPERIDOL	טיפול בתסמונת טורט	מותר להתרים
פרידור	PERIDOR	HALOPERIDOL	טיפול בבעיות פסיכיאטריות	לפנות לבירור לסמכות רפואית
פריזולין	PRISOLINE	PRIMIDONE	נגד התכווצויות	אסור להתרים
פריזיום	FRISIUM	CLOBAZAM	טיפול במצבי חרדה	מותר להתרים
פריזמה	PRIZMA	FLUOXETINE	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פרימולוט-נור	PRIMOLUT-NOR	NORETHISTERONE	טיפול הורמונלי	מותר להתרים
פרימוניל	PRIMONIL	IMIPRAMINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פרימל	PREMELLE	ESTROGEN, MEDROXYPROGESTERONE	טיפול הורמונלי בגיל המעבר (HRT)	מותר להתרים
פריסטיק	PRISTIQ	DESVENLAFAXINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פריפול	FERRIFOL	FOLIC ACID, IRON	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח לתיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
פריפל	FERRIPEL	IRON	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח לתיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
פריקאט	PERICATE	HALOPERIDOL	טיפול בסכיזופרניה ובעיות נפשיות שונות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
פרמיפקסול	PRAMIPEXOLE	PRAMIPEXOLE	טיפול במחלת פרקינסון	סיכון לירידת לחץ דם, מותר להתרים בהתאם למצבו התורם. לוודא שתייה, למדוד ל"ד ודופק 15 דקות לאחר תרומה
פרמיקסון	PERMIXON	LIPIDOSTEROLIC EXTRACT	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
פרמרין	PREMARIN	ESTROGEN	טיפול הורמונלי בגיל המעבר (HRT)	מותר להתרים
פרנדאז	PRANDASE	ACARBOSE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
פרסולאט	PRESSOLAT	NIFEDIPINE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
פרסולאט	PRESSOLAT	NIFEDIPINE	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
פרפולסיד	PREPULSID	CISAPRIDE	אזופגיסטים חריפה, רפלקס	מותר להתרים אם אין אזופגיסטים פעילה
פרפנאן	PERPHENAN	PERPHENAZINE	להרגעה	מותר להתרים
פרקודן	PERCODAN	ACETYL SALICYLIC ACID, OXYCODONE	נגד כאבים חזקים	לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים. לברר סיבה ולפנות לסמכות רפואית
פרקוסט	PERCOSET	OXYCODONE PARACETAMOL	נגד כאבים	לפנות לסמכות רפואית

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בשבירת	שם התרופה באנגלית	שם המדי	התוויה	הנחיות להתרומה
צ'מפיקס	CHAMPIX	VARENICLINE	להפסקת עישון	מותר להתרם
ציטאלופרם	CITALOPRAM	CITALOPRAM	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרם. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
צייטוטק	CYTOTEC	MISOPROSTOL	טיפול/מניעה כיב קיבה או תריסרון	מותר להתרם אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
ציסטגון	CYSTAGON	CYSTEAMINE	טיפול בגרופוסטיק ציסטינוזיס	יש לפנות לסמכות רפואית
ציסטדן	CYSTADANE	BETAINE ANHYDROUS	טיפול בהומוציסטאין גבוה	מותר להתרם
ציפראמיל	CIPRAMIL	CITALOPRAM	טיפול בדיכאון	מותר להתרם
ציפרוגיס	CIPROGIX	CIPROFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
ציפרודקס	CIPRODEX	CIPROFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
ציפרון	CYPRON	CYPROTERONE	טיפול הורמונלי	מותר להתרם
ציפרון	CYPRON	CYPROTERONE	טיפול בקרצינומה של הפרוסטטה	אסור להתרם
ציפרופלוקסצין	CIPROFLOXACIN	CIPROFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
ציפרלקס	CIPRALEX	ESCITALOPRAM	טיפול בדיכאון	מותר להתרם
ציפן	CIFRAN	CIPROFLOXACIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
צפויט	CEFOVIT	CEPHALEXIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
צפולאקס	CEFURAX	CEFUROXIME	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
צפורל	CEFURAL	CEPHALEXIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
צפלור	CEFALOR	CEFACTOR	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
קאנדסרטן פלוס	CANDESARTAN PLUS	CANDESARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן
קארדזוקסין	CARDOXIN	DIPYRIDAMOLE	דילול דם	יש לפנות לסמכות רפואית
קארין	KARIN	CLARYTHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
קבאסר	CABASER	CABERGOLINE	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרם בהתאם למצבו התורם
קבותרים	CABOTRIM	CABERGOLINE	טיפול ברמת פרולקטין גבוה	יש לפנות לסמכות רפואית
קבותרים	CABOTRIM	CABERGOLINE	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרם בהתאם למצבו התורם
קדקס	CADEX	DOXAZOZIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרם
קו-דיובאן	CO-DIOVAN	VALSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן
קוד-אקמול	COD-ACAMOL	CODEINE, PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרם
קוד-אקמול	COD-ACAMOL	CODEINE, PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרם לאחר החלמה
קודאברול	CODABROL	CODEINE, PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרם
קודאברול	CODABROL	CODEINE, PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרם לאחר החלמה
קודיביס	CODIVIS	PHENYLTOLOXAMINE, CODEINE	נגד שיעול	מותר להתרם לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
קודיקל	CODICAL	CODEINE, PARACETAMOL	נגד שיעול	מותר להתרם לאחר החלמה
קוואטי	QUETI	QUETIAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרם. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
קוואטיאפין	QUETIAPINE	QUETIAPINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרם. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
קוטיאסר	COTIASAR	LOSARTAN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן
קוטיאסר	COTIASAR	LOSARTAN	טיפול בבעיות לב	אסור להתרם
קולוטאל	COLOTAL	MEBEVERINE	טיפול במעי רגז	מותר להתרם
קוליציין	COLCHICINE	COLCHICINE	מניעה וטיפול בשיגדון וב FMF	מותר להתרם 24 שעות לאחר נטילת התרופה בהתאם להנחיות רפואיות
קולפרמין	COLPERMIN	PEPPERMINT OIL	טיפול במעי רגז	מותר להתרם
קומביגלייז	KOMBIGLYZE	METFORMIN, SAXAGLIPTIN	טיפול בסכרת	מותר להתרם אם סכרת מאוזנת
קומדין	COUMADIN	WARFARIN	נוגד קרישה	אסור להתרם
קומטן	COMTAN	ENTACAPONE	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרם בהתאם למצבו התורם
קומפטקט	COMPETACT	METFORMINE, PIOGLITAZONE	טיפול בסכרת	מותר להתרם אם סכרת מאוזנת
קונבריצה	CONBRIZA	BAZEDOXIFENE	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרם
קונברטין	CONVERTIN	ENALAPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן
קונברטין	CONVERTIN	ENALAPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרם
קונטרולוק	CONTROLOC	PANTOPRAZOLE	טיפול בכיב קיבה, רפלוקס, הליקובקטר	מותר להתרם אם אין עדות לדימום והמוגלובין תקין
קונסרטה	CONCERTA	METHYLPHENIDATE	טיפול בהפרעות קשב ופעלתנות יתר (ADHD)	מותר להתרם
קונקור	CONCOR	BISOPROLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרם אם לחץ הדם מאוזן- יש לבדוק דופק
קונקור	CONCOR	BISOPROLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרם

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	המחלות להחרמה
קוסטיקס	COSENTYX	SECUKINUMAB	טיפול בפסוריאזיס קשה	אסור להתרים
קופלויקס	COPLAVIX	ACETYL SALICYLIC ACID, CLOPIDOGREL	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך שבועיים אחרונים
קוראלאן	CORALAN	IVABRADINE	טיפול במחלת לב איסכמית	אסור להתרים
קורטיזון אצטט	CORTISONE ACETATE	CORTISONE ACETATE	טיפול במחלות אוטואימוניות, התקפי אסטמה/ אלרגיה	אסור להתרים במהלך הטיפול, לתרומות עתידיות לפנות לסמכות רפואית
קזודקס	CASODEX	BICALUTAMIDE	טיפול בסרטן פרוסטטה	אסור להתרים
קטאפלים	CATAFLAM	DICLOFENAC	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
קטאפלים	CATAFLAM	DICLOFENAC	טיפול בדלקת	אסור להתרים אם דלקת חריפה, או דלקת כרונית פעילה
קי-וואר	QVAR	BECLOMETHASONE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
קיורטן	CURATANE	ISOTRETINOIN	טיפול באקנה	מותר להתרים חודש לאחר סיום הטיפול
קינידין	QUINIDINE	QUINIDINE	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים
קינרט	KINERET	ANAKINRA	טיפול בראומטואיד ארטריטיס פעילה	אסור להתרים
קלאסיד	KLACID	CLARYTHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
קלבטן	KALBETEN	BISMUTH	טיפול בשלשול, בחילה, אי נוחות במע' העיכול	מותר להתרים אם אין עדות לגסטרואנטריטיס חריפה
קלבמוקס	CLAVAMOX	AMOXYCILLIN, CLAVULANIC ACID	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
קלוד	CLOOD	CLOPIDOGREL	דילול דם	יש לפנות לסמכות רפואית. לא לטרומבוציטים
קלוניריט	CLONNIRIT	CLONIDINE	למניעת התקפי מיגרנה	מותר להתרים
קלונקס	CLONEX	CLONAZEPAM	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
קלונקס	CLONEX	CLONAZEPAM	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
קלופיד	CLOPID	CLOPIDOGREL	דילול דם	יש לפנות לסמכות רפואית. לא לטרומבוציטים
קלופידוגרל	CLOPIDOGREL	CLOPIDOGREL	דילול דם	יש לפנות לסמכות רפואית. לא לטרומבוציטים
קלופידקסל	CLOPIDEXCEL	CLOPIDOGREL	דילול דם	יש לפנות לסמכות רפואית. לא לטרומבוציטים
קלופיקסול	CLOPIXOL	ZUCLOPENTHIXOL	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
קלוריל	KALURIL	AMILORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
קלוריל	KALURIL	AMILORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE	טיפול באי ספיקת לב	אסור להתרים
קליאוגסט	KLIOGEST	ESTRADIOL, NORETHISTERONE	טיפול הורמונלי בגיל המעבר (HRT)	מותר להתרים
קלמנרבין	CALMANERVIN	VALERIAN EXTR.	טיפול בהחרדה והפרעות שינה	מותר להתרים
קלצי-רב	CALCI-RAV	CALCIUM	תוספת סידן	מותר להתרים
קלצילס	CALCILESS	SODIUM, POTASSIUM	טיפול ומניעה אבנים בכליות	מותר להתרים אם תפקודי כליות תקינים
קלצימור	CALCIMORE	CALCIUM	טיפול בצרבת וחוסר סידן	מותר להתרים
קלריתרומצין	CLARITHROMYCIN	CLARITHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
קלרידקס	KLARIDEX	CLARYTHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
קלרימ	CLARINASE	LORATADINE	טיפול באלרגיה	מותר להתרים
קמדרין	KEMADRIN	PROCYCLIDINE	טיפול במחלת פרקינסון	מותר להתרים בהתאם למצבו התורם
קנדור פלוס	CANDOR PLUS	CANDESARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
קסטל	XATRAL	ALFUZOSINE	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
קסלג'אנז	XELJANZ	TOFACITINIB	טיפול אימונוסופרסיבי	אסור להתרים
קסנאגיס	XANAGIS	ALPRAZOLAM	טיפול במצבי חרדה ודיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
קסנאקס	XANAX	ALPRAZOLAM	טיפול במצבי חרדה ודיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
קסזין	XENAZINE	TETRABENAZINE	טיפול בהפרעות תנועה	יש לפנות לסמכות רפואית
קסניקל	XENICAL	ORLISTAT	להרזיה	מותר להתרים
קספו	XEFO	LORNOXICAM	נגד כאבים	מותר להתרים בהתאם למחלה/ מצב רפואי. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
קספליון	XEPLION	PALIPERIDONE	טיפול בסכיזופרניה	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
קסרלטו	XARELTO	RIVAROXABAN	דילול דם בסמוך לניתוח	לאחר סיום טיפול והחלמה מניתוח. לא לטרומבוציטים
קפטופריל	CAPTOPRIL	CAPTOPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
קפטופריל	CAPTOPRIL	CAPTOPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן

הנחיות להקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	החמירה	ההמלצה
קפרגוט	CAFERGOT	CAFFEINE, ERGOTAMINE	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרים אם ללא התקף ביום התרומה
קפרה	KEPPRA	LEVETIRACETAM	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
קראון	CREON	PANCREATIN	טיפול באי ספיקת/ דלקת כרונית בבלב	אסור להתרים
קרבדקסון	CARVEDILOL	CARVEDILOL	טיפול באי ספיקת לב	אסור להתרים
קרבוסילן	CARBOSYLANE	CHARCOAL, SIMETHICONE	טיפול באי נוחות במע' העיכול, גזים	מותר להתרים אם אין עדות לגסטרואנטריטיס חריפה
קרבוסילן	CARBOSYLANE	SIMETHICONE	טיפול באי נוחות במע' העיכול	מותר להתרים
קדורל	CARDORAL	DOXAZOSIN	טיפול בהגדלת פרוסטטה שפירה	מותר להתרים
קרדיופירין	CARDIOPIRIN	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
קרדילוק	CARDILOC	BISOPROLOL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
קרדילוק	CARDILOC	BISOPROLOL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן. יש לבדוק דופק
קרודילול	CARVEDILOL	CARVEDILOL	טיפול באי ספיקת לב	אסור להתרים
קרטיה	CARTIA	ACETYL SALICYLIC ACID	לדילול דם	בהתאם למחלה/מצב רפואי, לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
קרטור	CRESTOR	ROSUVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
קתדולון	KATADOLON	FLUPIRITINE	נגד כאבים	מותר להתרים
ראולין	REOLIN	ACETYLCYSTEINE	מכייח/טיפול בשיעול וליחה	מותר להתרים לאחר החלמה
ראלוקסיפן	RALOXIFENE	RALOXIFENE	טיפול באוסטיאופורוזיס	מותר להתרים
ראסילז	RASILEZ	ALISKIREN	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
רבוליד	REVOLADE	ELTROMBOPAG	טיפול ב ITP	אסור להתרים
רואקוטן	ROACCUTANE	ISOTRETINOIN	טיפול באקנה	מותר להתרים חודש לאחר סיום הטיפול
רוגסטי	ROGASTI	FAMOTIDINE	טיפול בכיב קיבה או תריסריון, רפלוקס	מותר להתרים אם אין עדות לדימום והמגולובין תקין
רוגען	ROGAAN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
רוגען	ROGAAN	ACETYL SALICYLIC ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
רודנל	RODENAL	BENZHEXOL	פרקינזונים וטיפול ב"ל" אקסטרופירמידיות משניות לטיפול תרופתי אחר	יש לפנות לסמכות רפואית
רואטיניקס	ROWATINEX	ANETHOLE BORNEOL CAMPHENE CINEOLE FENCHONE PINENE	טיפול נלווה בדלקת בדרכי השתן	מותר להתרים לאחר החלמה
רואכול	ROWACHOL	BORNEOL CAMPHENE CINEOLE MENTHOL MENTHONE PINENE	טיפול נלווה באבנים בכיס המרה	מותר להתרים
רואכול	ROWACHOL	BORNEOL CAMPHENE CINEOLE MENTHOL MENTHONE PINENE	טיפול במחלות כבד	אסור להתרים
רוטיו	REVATIO	SILDENAFIL	טיפול ביתר לחץ דם ריאתי	אסור להתרים
רוזובסטטין	ROSUVASTATIN	ROSUVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
רוליד	RULID	ROXITHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
רוקסין	RONEXINE	METHOTRIMEPRAZINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
רוסיני	ROSSINI	ROSIGLITAZONE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
רופינירול	ROPINIROLE	ROPINIROLE	טיפול במחלת פרקינסון	סיכון לירידת לחץ דם, מותר להתרים בהתאם למצבו התורם. לוודא שתייה, למדוד ל"ד ודופק 15 דקות לאחר תרומה
רוקל	ROKAL	CAFFEINE, CODEINE, ACETYL SALIC. ACID	נגד כאבים	מותר להתרים. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
רוקל	ROKAL	CAFFEINE, CODEINE, ACETYL SALIC. ACID	נגד חום ושיעול	מותר להתרים לאחר החלמה. לא לטרומבוציטים, אם קיבל במשך 3 ימים אחרונים
רוקמול	ROKAMOL	PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים
רוקמול	ROKAMOL	PARACETAMOL	נגד חום	מותר להתרים לאחר החלמה
רוקסו	ROXO	ROXITHROMYCIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
רוקסט	ROKACET	CAFFEINE, CODEINE, PARACETAMOL	נגד כאבים	מותר להתרים.

הנחיות להבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	המחלות להתרמה
רוקסט	ROKACET	CAFFEINE, CODEINE, PARACETAMOL	נגד חום ושיעול	מותר להתרים לאחר החלמה.
רזין	RAZIN	PHENTERMINE	טיפול בהשמנת יתר	מותר להתרים
ריבון	RIBONE	RISEDRONIC ACID	טיפול באוסטאופורוזיס, מחלת פג'ט	מותר להתרים
רידאורה	RIDAURA	AURANOFIN	טיפול בראומטיזם ארטריטיס פעילה	אסור להתרים
רידזין	RIDAZIN	THIORIDAZINE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
ריוטריל	RIVOTRIL	CLONAZEPAM	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
ריוטריל	RIVOTRIL	CLONAZEPAM	טיפול באפילפסיה	אסור להתרים
ריזדרונט	RISEDRONATE	RISEDRONIC ACID	טיפול באוסטאופורוזיס	מותר להתרים.
ריזלט	RIZALT	RIZATRIPTAN	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרים אם ללא התקף ביום התרומה
ריטלין	RITALIN	METHYLPHENIDATE	טיפול בהפרעות קשב ופעלתנות יתר (ADHD)	מותר להתרים
ריטמיקל	RYTHMICAL	DISOPYRAMIDE	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים
רילוטק	RILUTEK	RILUZOLE	טיפול ב ALS (סקלרוזיס)	אסור להתרים
רילרט	RELERT	ELETRIPTAN	טיפול בהתקפי מיגרנה	מותר להתרים אם ללא התקף ביום התרומה
רימקטן	RIMACTANE	RIFAMPICIN	טיפול בשחפת וצרעת	אסור להתרים
ריספונד	RISPOND	RISPERIDONE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
ריספפר	RISPEFAR	RISPERIDONE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
ריספרדל	RISPERDAL	RISPERIDONE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
ריספרידקס	RISPERIDEX	RISPERIDONE	טיפול בבעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
ריתמקס	RYTHMEX	PROPAFENONE	טיפול בהפרעות קצב	אסור להתרים
רכיב	REKIV	BISMUTH MAGNESIUM SODIUM	טיפול בצרבת	מותר להתרים
רלנזה	RELENZA	ZANAMIVIR	טיפול בשפעת	מותר להתרים לאחר סיום טיפול והחלמה מלאה
רלקסין	RELAXINE	VALERIAN EXTR.	טיפול במצבי חרדה והפרעות שינה	מותר להתרים
רמוטיב	REMOTIV	HYPERICI HERBA EXTRACTUM	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
רמיטנס	RAMITENS	RAMIPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
רמיטנס	RAMITENS	RAMIPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
רמיפריל	RAMIPRIL	RAMIPRIL	טיפול ביתר לחץ דם	מותר להתרים אם לחץ הדם מאוזן
רמיפריל	RAMIPRIL	RAMIPRIL	טיפול בבעיות לב	אסור להתרים
רמיקד	REMICADE	INFLIXIMAB	טיפול אימונוסופרסיבי	אסור להתרים
רמרון	REMERON	MIRTAPAZINE	טיפול בדיכאון	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
רנקסה	RANEXA	RANOLAZINE	טיפול במחלת לב איסכמית כרונית	אסור להתרים
רסיטל	RECITAL	CITALOPRAM	טיפול בדיכאון ובעיות נפשיות	מותר להתרים. יש לוודא שתורם במצב נפשי תקין ובא לתרום מרצונו
רספריס	RESPRIM	SULPHAMETOXAZOLE TRIMETHOPRIM	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
רפאגליניד	REPAGLINIDE	REPAGLINIDE	טיפול בסכרת	מותר להתרים אם סכרת מאוזנת
רפאסאל	RAFASSAL	MESALAZINE	טיפול במחלת קרוהן וקוליטיס מכוויבת (Ulcerative Colitis)	אסור להתרים
רפאפן	RAFAPEN	PENICILLIN	אנטיביוטיקה	מותר 3 ימים לאחר סיום הטיפול והחלמה מלאה
רפטיבה	RAPTIVA	EFALIZUMAB	טיפול בפסוריאזיס קשה	אסור להתרים
רקוד	RECOD	CODEINE	טיפול בשיעול, כאבים	מותר להתרים לאחר סיום הטיפול בהתאם למצב הרפואי
רקוויפ	REQUIP	ROPINIROLE	טיפול במחלת פרקינסון	סיכון לירידת לחץ דם, מותר להתרים בהתאם למצבו התורם. לוודא שתייה, למדוד ל"ד ודופק 15 דקות לאחר תרומה
רקמיד	REKAMIDE	LOPERAMIDE	נגד שלשולים	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
שלשול X	SHILSHUL X	LOPERAMIDE	טיפול בשלשול	מותר להתרים שבוע לאחר החלמה
תאוטרד	THEOTARD	THEOPHYLLINE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
תוריד	TORID	ATORVASTATIN	טיפול בעודף כולסטרול בדם	מותר להתרים
תיאונטרם	THEOTRIM	THEOPHYLLINE	טיפול באסטמה	מותר להתרים בהתאם להנחיות רפואיות (ראה אסטמה)
תנדיפרון	TARDYFERON	FERROUS SULPHATE	טיפול בחוסר ברזל ואנמיה	מותר להתרים אם לא נלקח בתיקון אנמיה/חוסר ברזל והמוגלובין תקין
תרוקטיל	TAROCTIL	CHLORPROMAZINE	טיפול בחרדה	מותר להתרים
תרוקטיל	TAROCTIL	CHLORPROMAZINE	טיפול בבחילה, הקאה, הפרעות תנועה, פורפיריה ועוד	אסור להתרים

הנחיות לקבלת תורמי דם - תרופות

שם התרופה בעברית	שם התרופה באנגלית	שם גנרי	התוויה	המחלות להתרמה
תרם	TARIM	SILDENAFIL	טיפול בבעיות זקפה	מותר להתרים 12 שעות לאחר הטיפול
תרימקסול	TRIMEXOL	PRAMIPEXOLE	טיפול במחלת פרקינסון	סיכון לירידת לחץ דם, מותר להתרים בהתאם למצבו התורם. לוווא שתייה, למדוד ל"ד ודופק 15 דקות לאחר תרומה