



מגן דוד אדום - אגף הרפואה

הנחיות התמגנות לאיש צוות



לצפייה בסרטון המציג את התהליך במלואו:

<https://youtu.be/SV0Eha7hynI>





תהליך ההתמגנות

ביצוע היגיינת ידיים

מים וסבון,
נוזל חיטוי אלכוהולי
או ג'ל אלכוהול

בצע היגיינת ידיים





תהליך ההתמגנות

עטיית כפפות
פנימיות





תהליך ההתמגנות

לבישת מסיכת
FFP3



FFP3 או N95

לחודא התאמה לתווי הפנים.





תהליך ההתמגנות

לבישת מגן עיניים



מסכת פה אך עיניים,
משקפי מגן או מסכת ויזור
ייעודית מעל לכובע הסרבל





תהליך ההתמגנות

לבישת סרב





תהליך ההתמגנות

חבישת כובע
הסרביל





תהליך ההתמגנות

נעילת ערדליים



נעילת ערדליים





תהליך ההתמגנות

עטיית כפפות
חיצוניות



✓ עטית הכפפות תוך
העלאתן מעל שרוולי
הסרבל





הכנת המטופל

✓ יש לוודא כי המטופל לבש מסיכת פה אף כפי שהנחה המוקד.

✓ אם אין ברשותו מסיכה, יש לספק לו

✓ במידה והמטופל זקוק לחמצן, יש להניח על פניו מסיכת חמצן (ללא מסיכת פה-אף).





תהליך הסרת המיגון

הסרת הכפפות
החיצוניות

✓ הסרת הכפפה
הראשונה על ידי
תפיסתה בצידה
החיצוני באמצעות היד
השנייה והפיכתה
החוצה.



הסרת הכפפה הראשונה על ידי תפיסתה בצידה





תהליך הסרת המיגון

הסרת הכפפות
החיצוניות



✓ הסרת הכפפה השנייה
על ידי תפיסתה בצידה
הפנימי על ידי היד
השנייה והפיכתה החוצה.

הסרת הכפפה השנייה על ידי תפיסתה בצידה הפנימי





תהליך הסרת המיגון

✓ הסרת הכובע והסרבל על ידי הפיכתו מבפנים החוצה בזהירות וגלגולו בזהירות לאורך כל הגוף

הסרת הסרבל



הסרת הסרבל בזהירות החל מכיסוי הראש ומטה ע"י גלגולו





תהליך הסרת המיגון

✓ הסרת הערדליים תוך
גלגולם והחצנה של
החלק הפנימי

הסרת הערדליים



הסור את הערדליים תוך גלגולם והחצנה של החלק הפנימי





תהליך הסרת המיגון

✓ אין לגעת בחלק הקדמי של מגן העיניים.

הסרת מגן העיניים





תהליך הסרת המיגון

✓ אין לגעת בחלק הקדמי של
המסכה

✓ הסרת הרצועה התחתונה מעל
לראש ולאחריה הרצועה
העליונה

הסרת מסיכת FFP3





תהליך הסרת המיגון

✓ הסרת הכפפות בדומה לאופן
הסרת הכפפות החיצוניות

הסרת הכפפות
הפנימיות



הסרת הכפפות הפנימיות





תהליך הסרת המיגון

ביצוע הגיינות ידיים

מים וסבון,
נוזל חיטוי אלכוהולי
או ג'ל אלכוהול

בצע היגיינות ידיים





תהליך הסרת המיגון



השלכת כל פריט
שהסרת אל שקית
פסולת מזוהמת





חיטוי האמבולנס

✓ ניתן להשתמש באמבולנס שעבר
ניקוי וחיטוי שגרתי בתמיסה על בסיס
כלור, מיד לאחר שהאמבולנס נקי
יבש ומאוורר.

בעת ביצוע החיטוי
– איש הצוות ממוגן

תמיסת כלור בריכוז 1000 ppm
לכחות ובהתאם להנחיות





הציוד הרפואי

✓ במידה ונעשה שימוש בציוד רפואי
(מפוח, לרינגוסקופ וכו') לטיפול
בחולה, הוא יוכנס לשקית פסולת
מזהמת ויטופל בהתאם לנהלי מד"א.

הטיפול בציוד
הרפואי





הגיינת ידיים

בסיום התהליך -
ביצוע הגיינת ידיים
נוספת

