



В экстренном
случае звоните

101




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Национальная Организация Спасения



Профилактика и лечение аллергических реакций

это в наших руках

Аллергическая реакция

это повышенная чувствительность и реакция иммунной системы организма на введение инородных белковых компонентов.

То есть иммунная система реагирует на белок как на инородное, чужое тело.

Классификация

Инородное тело (белок) называется "АЛЛЕРГЕН".

В природе существуют сотни разновидностей аллергенов.

Начиная с: синтетических веществ, шерсть животных, ежедневные продукты питания, например: молоко, орехи, кунжут(тхина), арахис, халва, водоросли, морепродукты, яйца, пшеница и т.д.

Факторы вызывающие аллергию

Факторы не понятны. Существуют предположения, что речь идет о генетических и сопровождающих природных факторах. and environmental factors.

Симптоматика

- Дыхательная система - проявляется в виде свистящего дыхания, сухого, утомительного кашля, одышка, зуд и отечность глотки и трахеи, губ, языка, охриплость голоса, чихания, жжения в горле.
- Кожный покров: Зуд, распространенная сыпь, отечность конечностей, глаз.
- Пищеварительная система: Тошнота, рвота, боли в животе, понос.
- Сердечно-сосудистая система: Бледность, головокружение, обморок, синюшность, резкое снижение артериального давления.

Опасность

Проблемы дыхания, снижение давления, удушье, обструкция дыхательных путей, потеря сознания и смерть.

Важность временного фактора!

При проявлении симптомов, данное состояние очень опасно для жизни пациента и поэтому требуется немедленное вмешательство профессионалов.

Что делать

Знание и профилактика могут спасти жизнь человеку, страдающему от этой патологии.

Создание безопасного окружения

В учреждениях необходимо создать план действий.

Опасность можно предупредить. Ответственность за это - на всех нас!

Как создать безопасное пространство

1. Подготовка плана действий на административном уровне и на уровне оказания помощи.
2. Распространение и координация функциональных обязанностей персонала проводится заранее.

Что делать Подготовка действий при аллергической реакции, могущей привести к смертельному исходу.

- 1 Инъекция шприцом "Эпифен".
- 2 Немедленно позвонить в колл центр **МАДА 101**
- 3 Если нет улучшения в течении 5-7 минут, сделайте повторную инъекцию.
- 4 Если пациент без сознания, бездыханный, немедленно приступить к проведению реанимационных мероприятий (закрытый массаж грудной клетки).




A Возьмите и откройте пластиковую упаковку и выньте шприц-ручку.

B Вытащите синюю кнопку и обхватите шприц-ручку посередине 4-мя пальцами (центре шприца)

C Оранжевую часть шприца направьте на наружную часть бедра пациента (одетого, если одежду снять невозможно).

D Направьте шприц под углом 90° и нажмите до щелчка. Держите шприц без движения прижатым к бедру в течении 3 секунд.



В случае сомнения ЗВОНИТЕ 101.

Сотрудник МАДА, находящийся с вами на линии, поможет оценить состояние пациента и выявить симптомы могущие угрожать жизни пациента, а так же дать рекомендации по проведению реанимационных мероприятий.

Консультация: проф. Нэнси Агмон-Левин, руководитель отделения клинической иммунологии, ангионевротического отека и аллергии, Центр аутоиммунных заболеваний Заблудовича, Медицинский центр Шиба, Больница Тель-Хашомер

FOOD Allergy
העמותה הישראלית לאלרגיות למזון (ע"ר)



Эпи-пен находится:



Отсканируйте и загрузите приложение прямого набора на горячую линию 101

Для регистрации и информации о курсах
***8101** www.mdais.org

Маген Давид Адом В Израиле

