



En cas d'urgence
Appelez le
101




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS



Prévention et traitement de la réaction allergique

C'est entre nos mains!

Réaction allergique

Une réaction allergique est une réponse du système immunitaire aux protéines étrangères.

Cela signifie que le corps le traite de la même manière que tout corps étranger.

Types

La protéine étrangère est appelée un «allergène». Il existe des centaines d'allergènes: matières synthétiques, pelage animales et autres aliments que nous pouvons consommer régulièrement tels que les produits laitiers, les noix, les arachides, le sésame (y compris le tahini et le halva), les fruits de mer, les œufs, le blé et autres.

Causes

Les causes sont inconnues. Cependant, l'hypothèse générale est qu'elle repose sur une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux.

Signes et symptômes

- Système respiratoire - difficulté à respirer, respiration sifflante, toux persistante, grattage ou gonflement de la gorge, des lèvres ou de la langue, éternuements sensation de brûlure dans la gorge.
- La peau - une éruption cutanée généralisée, des démangeaisons, un gonflement des extrémités ou des yeux et un œdème.
- Système digestif - nausées, vomissements, douleurs à l'estomac, crampes et diarrhée.
- Système circulatoire - pâleur, étourdissements, syncope, cyanose et hypotension.
- Incontinence.

Les risques

Obstruction des voies respiratoires, suffocation, diminution soudaine de la pression artérielle, perte de conscience et même mort.

Le temps presse!

L'apparition des symptômes présente une menace pour la vie de la personne et nécessite un traitement IMMÉDIAT.

La solution:

La sensibilisation et la prévention peuvent sauver des vies.

Créez un environnement sûr

Tous les lieux publics devraient créer un plan pour éviter l'exposition aux allergènes.

Il est de notre responsabilité d'empêcher l'exposition.

Conseils pour créer un environnement sûr

1. Établissez un plan aux niveaux de la gestion et du traitement.
2. Donnez à l'avance des responsabilités claires à chaque membre de l'équipe.

Traitement Étapes à suivre pour traiter une réaction allergique potentiellement mortelle

- 1 Attribuez de l'Epi-pen.
- 2 Contacter le **MDA 101** Centre d'appels d'urgence dès que possible.
- 3 S'il n'y a pas d'amélioration évidente, donnez un Epi-pen supplémentaire 5 à 7 minutes après le premier.
- 4 Si le patient ne répond pas et ne respire pas, commencez immédiatement la RCR.

- A Ouvrez l'étui plastique et retirez l'Epi-pen.
- B Tenez l'Epi-pen au milieu et retirez la sécurité bleue.
- C Placez la partie orange contre la cuisse du patient (cela peut être fait à travers les vêtements du patient).
- D Injectez l'Epi-pen à un angle de 90 degrés jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Maintenez l'Epi-pen en place pendant 3 secondes



En cas de doute Appelez le 101

Les Paramédiques et Secouristes du MDA sont prêts à vous aider dans toute situation mettant la vie en danger!

Consultation: Prof. Nancy Agmon- Levin, Head of the Clinical Immunology, Angioedema and Allergy Unit, The Zabudowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Tel Hashomer Hospital

FOOD Allergy
העמותה הישראלית לאלרגיות למזון (ע"ד)

יהל
העמותה לאלרגיות מזון

איח"ד
IAACI
Israel Association of Allergy and Clinical Immunology

משרד הבריאות
כחיים בריאים יותר

L'Epi-pen se trouve:



Scannez et téléchargez l'application MyMDA pour un contact direct avec le centre d'appels d'urgence MDA 101

Pour informations et formations

***8101** www.mdais.org

Magen David Adom in Israel

